

Sjældne fugle i Vejle Amt, 1838 – 2003

(del 2)

af

Hans Pinstrup

Denne oversigt omhandler nogle af de sjældnere fuglearter, som ses uregelmæssigt, men som alligevel er iagttaget adskillige gange i amtet.

Listen af disse arter er lang, så det har været ”nødvendigt” at foretage et valg, som er faldet ud til fordel for de 50 arter, som omtales i oversigten.

Som det var gældende ved oversigten over forekomsten af de meget sjældne arter, er det undertegnede, som ene og alene er ansvarlig for denne oversigts indhold.

Jeg har også i denne oversigt valgt at medtage en del ældre - måske oven i købet tvivlsomme (med den viden vi har i dag) – observationer og notitser, da jeg synes, disse iagttagelser i nogle tilfælde ligefrem er specielle, underholdende og/eller særprægede. Desuden er der medtaget enkelte oplysninger om arkæologiske fund (knogler), som vedrører Oldtiden (sandsynligvis Stenalderen).

Endvidere har jeg helt for egen regning fravalgt enkelte nyere observationer, som måske endda har været bragt i DOF-Vejles lokalrapporter, eller som f. eks. findes i DOF-basen – at en observation er indtastet i DOF-basen er ikke nødvendigvis en garanti for, at den er kommet med i denne oversigt eller for den sags skyld i oversigten over de sjældne arter, som jeg tidligere har udarbejdet.

Der findes uden tvivl iagttagelser, som jeg ikke har kendskab til, og som derfor ikke er kommet med i denne oversigt. Ligeledes findes der utvivlsomt observationer, jeg simpelt hen har overset i min gennemgang af diverse bøger, tidsskrifter, artikler m.m. Endvidere findes litteratur, som jeg ikke har gennemgået, f. eks. jagtblade m.m.

Supplerende oplysninger til de 2 oversigter modtages derfor gerne.

Imidlertid, og på trods af eventuelle fejl og mangler, håber jeg, at denne oversigt kan være med til at kaste lys over forekomsten af nogle af de ”halvsjældne” fuglearters optræden i Vejle Amt.

Denne oversigt er desuden tænkt som et materiale, som frit vil kunne anvendes af andre, som eventuelt på et senere tidspunkt kunne få lyst til at fordybe sig i en fuglearts forekomst i amtet – så længe det varer ved.

God læselyst !

-

Artsgennemgang:

Sortstrubet Lom *Gavia arctica*

Almindelig træk- og vintergæst fra Fennoskandinavien og Rusland.

Arten er ikke nær så talrig i Vejle Amt som dens nære slægtning, Rødstrubet Lom. Antallet af iagttagne fugle er steget de senere år som følge af øget ornitologisk aktivitet ved kysterne (bl. a. ved Bjørnsknude, Rosenvold og Trelde Næs).

Winge (1903) nævner et knoglefund (midtstykke af et albueben) af *Colymbus arcticus*, som er fundet inderst i Kolding Fjord i forbindelse med opmudringer i sidst i 1800-tallet. Antageligt fra Stenalderen.

Collin (1888): ”Skudt i Vejle Fjord d. 12. Januar 1882, ..., ved Nørre Snede pr. Horsens (gammel Han) af Forstkandidat E. Hornemann d. 12. Dec. 1887.”

Collin (1895): ”9. Dec. s. A. (1891) ligeledes skudt i ren Sommerdragt i Lillebælt v. Fredericia.”

Faber (1898): ”Skudt paa Vejle Fjord den 30/10 81 og 14/1 94

2/4 1964 1 anskudt Vejle Inderfjord (Have Jørgensen, 1970)

År	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991
Antal	-	2	7	19	9-10	22	5	1	1	3	5	5
År	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Antal	1	9	13	13	11	14	15	13	5	11	10	18

Forekomst af Sortstrubet Lom i Vejle Amt, 1980 – 2003.

Største forekomster: 15/1 1983 6 Stenderup Hage, 28/12 1983 5 N + 3 rastende Trelde Næs, 5/1 1985 9 rastende Stenderup Hage, 5/1 1994 8 rastende Bjørnsknude, 28/9 1996 4 V Træskohage, 4/11 2001 5 V Vejle Fjord ved Staksrode, 8/12 2002 4 V Rosenvold, 17/4 2003 5 N Bjørnsknude og 8/11 2003 4 V Rosenvold.

Indlandsobs.: 2/1 1981 1 (olieskadet) Fårup Sø, 26/11 1981 1 juv. Stallerup Sø, 21/3 1982 1 Bygholm Sø, 27/11 1982 2 Fårup Sø, 16/1 1983 1 Nørrestrand, 19 + 22/3 1990 1 Donssøerne, 2/3 1991 1 Donssøerne, 4/3 1991 1 Nørrestrand, 17/3 1992 1 Rands Fjord, 25/1 1995, 1 Nørrestrand, 12/12 1996 1 ad. Dollerup Sø, 19/1 1997 1 Rands Fjord og 3/4 1999 1 ad. Nørrestrand.

Nordisk Lappedykker *Podiceps auritus*

Sjælden træk- og vintergæst fra Skandinavien, Finland og Rusland. Meget sjælden sommergæst.

Faber (1898): ”Den 30/10 83 blev 1 Expl. skudt på Vejle Fjord; det indsendtes til Zool. Museum.”

August 1966 1 skudt Vejle Inderfjord

24/9 1973 1 Vejle Fjord

Fra begyndelsen af 1980'erne fåtallig, men regelmæssig gæst, specielt omkring Horsens Fjord, hvorfor der i skemaet helt naturligt forekommer mange gengangere (især fra årene 1998-99). Det ser i øvrigt ud til, at det er helt afgørende for antallet af nordiske lappedykkere, at der i vinterhalvåret optælles regelmæssigt ved Borre i Horsens Fjord.

De største forekomster: 7/11 1998 7 Borre Odde og 18/10 1999 9 Borre Odde.

Periode	1980 - 1984	1985 - 1989	1990 - 1994	1995 - 1999	2000 - 2003
Antal eks.	5	14	36	154	30

Forekomst af Nordisk Lappedykker i Vejle Amt, 1980 – 2003.

Mallemuk Fulmarus glacialis

Gæst fra Nordatlanten. Invasionsagtig optræden i amtet i marts/april 1962 og i september 1997. Ingen forekomster i årene 2000 – 2003, selv om der blev observeret flittigt ved kysterne (specielt ved Bjørnsknude og Rosenvold).

Samtlige data:

1916 1 skudt Lillebælt (DOFT, 18. årg., 1924, p. 33)
23/2 1962 1 død Trelde
27/2 1962 1 død vest for Give
Pr. marts 1962 3 døde Nr. Snede
Pr. marts 1962 1 død Vejle (Vedelsgade)
Ca. 1/3 1962 1 Tirsbæk
4/3 1962 1 død Vejle Fjord
8/3 1962 1 død Vejle (Ibæk Strandvej)
10/3 1962 1 Bybæk, Vejle
10/3 1962 1 død Vejle
12/3 1962 1 Vejle Fjord
26/3 1962 2 døde Vejle (Sønderåens udløb)
26/3 1962 1 død Vejle (Ibæk Strandvej)
27/3 1962 2 døde Vejle (Ibæk Strandvej)
28/3 1962 1 død Vejle
29/3 1962 1 død Vejle (Sønderåens udløb)
29/3 1962 1 død Tirsbæk
Pr. april 1962 7 døde Vejle Fjord
Pr. april 1962 4 døde Hvidbjerg Strand
Dec. 1978 2 Vejle Inderfjord
10/11 1984 1 Tirsbæk Strand
25/11 1984 1 St. Batteri, Jensgård Skov
27/8 1989 1 Ibæk, Vejle Fjord
21/3 1990 1 død Dollerup Sø
22/10 1995 1 ØNØ Rosenvold (kl. 09.05)
22/10 1995 1 NØ Bjørnsknude (antageligt samme som sås ved Rosenvold kl. 09. 20)
24/11 1996 1 V Trelde Næs
19/9 1997 1 V Rosenvold
19/9 1997 1 V -> Ø Sejet Nørremark, Horsens Fjord
20/9 1997 80 Rosenvold (30 V, 9 V -> Ø, 10 NØ, 13 N, 15 S, 3 R)
20/9 1997 1 SV Endelavefærgen
20/9 1997 2 N Pøt Strand
20/9 1997 5 N + 1 S Bjørnsknude
20/9 1997 1 R Sejet Nørremark
20/9 1997 1 Ø Vorsø
21/9 1997 1 S + 1 SV + 5 N Bjørnsknude
21/9 1997 12 V + 1 V -> R + 1 R Rosenvold
22/9 1997 2 Trelde Næs
24/9 1997 2 V -> R + 1 R Rosenvold
30/9 1997 1 Ø Rosenvold
5/10 1997 1 S Hundshage

14/10 1997 1 S Bjørnsknude
19/8 1998 1 V -> R Rosenvold
2/9 1998 2 SV Rosenvold
3/9 1998 1 S Bjørnsknude
20/10 1998 1 S Rosenvold
22/8 1999 1 N Bjørnsknude
17/10 1999 1 S Bjørnsknude

Sule *Sula bassana*

Gæst fra de Britiske Øer, Færøerne, Island og Norge. Iagttages primært (og mest talrigt) i efterårs-månederne. Invasionsagtig optræden i 1968, 1984, 1990, 1995, 1996 og 1998.

Collin (1877/1895): ”I Efteraaret 1883 skudt ved Fredericia.”

16/10 1938 1 Vejle Fjord (ringmærket i juli 1936, Bass Rock, England) (Adelholt, 1958)

De største forekomster: 11/9 1966 7 Trelde Næs, 15/10 1968 13 Trelde Næs, 16/10 1968 6 Trelde Næs, 8/10 1982 min. 8 Trelde Næs/Båring Vig, 1/9 1984 23 Endelave, 1/9 1984 9 Stenderup Hage, 23/9 1990 34 Bjørnsknude, 30/9 1995 15 Rosenvold, 1/10 1995 10 Rosenvold, 21/10 1995 7 Bjørnsknude, 4/11 1995 8 Trelde Næs, 4/11 1995 6 Bjørnsknude, 19/10 1996 8 Bjørnsknude, 20/9 1997 8 Bjørnsknude, 18/10 1998 14 Bjørnsknude, 24/10 1998 6 Rosenvold, 4/10 2000 8 Rosenvold og 16/8 2003 7 Bjørnsknude.

Indlandsobs.: 22/10 1984 1 Dollerup Sø og 21/9 1990 1 ad. Bjerre – fuglen rastede på græsplænen i en baghave.

Periode	1900 - 1969	1970 - 1979	1980 - 1989	1990 - 1999	2000 - 2003
Antal eks.	28	1	63	226	61

Forekomst af Sule i Vejle Amt, 1966 – 2003.

Rørdrum *Botaurus stellaris*

Sjælden yngltræk- og ynglestandfugl i Danmark, flest i Nordvestjylland (Vejlerne), samt meget sjælden træk- og vintergæst fra Sverige. Årlig gæst i amtet siden begyndelsen af 1990'erne.

Kjærbølling/Collin (1875-77): ”skudt ... et i Januar d, A. (1876) ved Fredericia.”

Collin (1895): ”17. Febr. 1885 skudt Kolding.”

Faber (1898) skriver: ”Den 3/9 92 blev et Expl. skudt ved Taulov Sø pr. Fredericia.”

Kristensen (1899): ”Hørt d. 18. August 1898 sent om Aftenen i Hesselballe Kjær af Provisor Møller, Uldum Apothek.”

10/9 1905 ung han Rands Fjord (P. Skovgaard, 1920)
1939 1 skudt ved Dons Nørresø (Schjötz-Pedersen, 1943)

Periode	1973 - 1979	1980 - 1989	1990 - 1999	2000 - 2003
Antal fugle	4	14	27	12

Forekomst af Rørdrum i Vejle Amt, 1973 – 2003.

Sort Stork *Ciconia nigra*

Tidligere en fåtallig ynglefugl i Danmark (ca. 150 par midt i 1800-tallet). I dag en meget sjælden yngletrækfugl (antageligt 1-5 par i Jylland). Meget sjælden - sjælden træk- og sommergæst fra Østeuropa, især østlige Tyskland og Polen.

Collin (1888): ”I Horsens-Eggen er den nu i en længere Aarrække fundet ynglende i Møgelkjær Skov og Starup Skov.”

P. Herschend skriver i 1884 blandt andet: ”I Addit Skov ved Silkeborg findes endnu reder...”

Faber (1898) nævner 2 konkrete fund: 13/5 1881 rede med 5 æg St. Grundet Skov og 16/4 1882 rede med 5 æg Starup Skov. Endvidere nævner Faber, at han har fundet dens rede i Møgelkær Skov ved Horsens.

Kristensen (1899): ”Set i Alsted Skov i Efteraaret 1898 af Lærer Kristensen, Tørring.”

Larsen (1901): ”Yngler i Velling Skov under Palsgaard Skovdistrikt; den har ynglet her i mange Aar og ses hver Sommer vadende i Ejstrup Sø.”

Georgsen (1902): ”Atter 1901 har den sorte stork ynglet i Ustrup Skov pr. Horsens; der var 4 unger.”

Rosendahl (1975): ”... Løndal Nederskov til 1899, Addit Skov til 1882, Julianelyst Skov i hvert fald til 1852, Matstrup Skov mindst til 1852 og Rask Skove til 1853, dog sikkert også senere. Endvidere er skovene ved Sdr. Vissing og Ring Skov nævnt som ynglepladser i forrige århundrede. Horsens Fjord og dens omegn kunne byde på ynglepar i Bjerre Skov til 1909 (her var flere år 2 par, bl. a. i 1908), Boller Nederskov indtil 1904, Ustrup Skov til 1901, Stensballe Skov til 1898, ... Rosenvold Skov (vel Stouby eller Staksrode Skov) til omkring 1880+, Barrit Skov til ca. 1880 og Palsgård Skov samt Lottrup Skov også i forrige århundrede. Vejleegnen havde ynglepar i St. Grundet Skov til 1881, i Lerbæk Skov, i Engelsholm Skov i hvert fald til 1870-erne, i Starup Skov til 1890 og i Hesselballegård Skov til 1898. Kongeåen og dens omgivelser husede par i Stenderup Skovene til omkring 1850, i Fovslet Skov til 1910...”

5/4 1901 1 Klokkedal, Horsens (Georgsen, 1901)

27/4 1916 1 Palsgård (Wielandt, 1924)

April 1965 par byggede rede Kongsø Plantage ved Halle Sø (Novrup, 1972)

Juli 1967 1 Tinnets Dambrug

17/6 1969 1 Tinnets Dambrug

Sommeren 1971 1 Tinnets Dambrug

April 1974 1 par ”Vejle Amt”

Juni 1974 1 par ”Vejle Amt”

Efterår (oktober ?) 1974 3 Åkær Å

6/7 1975 2 ad. N Bindeballe

16/8 1977 3 Egholt Å

26/5 1979 1 Dollerup Sø

22/5 1982 1 par "Kolding"
28/7 1982 1 N Dollerup Sø
28/6 1984 1 Fovslet Skov
21/8 1984 1 Brændsmade
22/8 1985 1 Brændsmade
25/8 1985 1 Højrup
16-17/8 1986 1 Søgård Sø
24/4 1987 1 Kragelund Fælle
27/7 1987 1 Gudsø Vig
4-5/6 1988 1 Øster Starup
20-28/8 1988 1 1k Øster Starup
20/8 1990 1 ad. SV Høll – senere rastende ved Skærup
28/8 1991 1 Nr. Vilstrup
6/9 1991 1 Flemming, Horsens
26/5 1993 1 2k Gramrode
15/4 1994 1 "Vejle Amt"
18 + 30/5 1995 1 Dollerup Sø
10/8 1995 1 S Hover, Vejle
20/8 1995 1 1k S Dollerup Sø
20/8 1995 1 Ferup Skov (samme som ovenstående)
19/5 1996 1 Askær
12/8 1998 1 Juelsminde
3/9 1999 1 Stensballe
16/5 2000 1 Runkenbjerg
1/6 2000 1 Vester Nebel (fanget i net ved dambrug og sluppet i god behold)
9/6 2000 1 Spjarup Mose
4/8 2000 1 Donssøerne
1/9 2002 1 ad. VSV kl. 1101 – 1112 Rosenvold
20 – 25/9 2002 1 1k Nr. Vilstrup – havde opholdt sig på stedet siden ca. 14/9.
Ca. 20/8 – 10/9 2003 1 1k Flemming v. f. Horsens

Hvid Stork *Ciconia ciconia*

Tidligere en almindelig ynglefugl. Nu forekommer storken kun tilfældigt, men dog årligt, som træk- og sommergæst.

Collin (1888): "I 1884 indfandt 2 unge Storke sig i Horsens, hvor de tog en Rede i Besiddelse. De forbleve der, efter at de andre Storke vare dragne bort, og uagtet der i Slutningen af November indtraadte stærk Kulde (om Natten indtil – 14° R.), forlode de ikke Egnen; dog maatte der lægges Føde ud til dem. I Januar tog de en anden Rede og forbleve der hele Vinteren over."

Collin (1895): " ..., at Faber 12. Juni 1894 talte 21 beboede Reder i Landsbyen Ølholm i Vejle-Egnen."

Faber (1898) skriver: "Ankommer til Vejle i de sidste Dage af Marts eller de første Dage af April. Den 19/2 94 saa jeg en Stork i en Rede i Vejle, men den blev der kun nogle faa Dage; mulig har det været et tamt Individ. I Vejle By findes flere beboede Reder. I Landsbyen Ølholm findes c. 30 Re-

der, hvoraf alene paa en Bondegaard 7. Det er de vidtstrakte Moser ved Uldum og Hesselballe, der begrunde det store Antal Storke. I Landsbyen Hansted ved Horsens var i mine Drengaar ogsaa en stor Mængde beboede Storkereder, men nu er de taget betydeligt af der.

Georgsen (1901) nævner: "Ankom til Thyrsted: 10/4 1900 og 31/3 1901."

Rosendahl (1974): "I Ølholm talte ældre folk i 1926 om, at der tidligere havde været 80 par i byen, mens de yngre kun havde oplevet 20 par. I 1898 skal der have været 30 reder, hvoraf de 7 fandtes på én gård. Først i 1930-erne var der endnu 2 beboede reder. Kalhave vest for Horsens skal have haft ca. 10 reder. Hornborg havde i forrige århundrede omkring en halv snes reder. Horsens havde i 1898 endnu 16 beboede reder, af hvilke de 4 var på tugthuset. I 1911 og senere var der ingen beboede reder i selve byen. Hansted havde omkring 1863 over 50 beboede reder, 1875 var der over 20, men i 1883 var der næppe 10 tilbage. Først i 1930-erne var der 1 rede. Uldum havde i 1870 mange reder. Endnu i 1889 var der 1 på præstegården, og 1 på nabogården. Så var der i en lang periode ingen, men fra 1932 atter 1 par. Østedgaard ved Rands Fjord havde altid Storke, men aldrig flere end 4 reder. I 1898 var der dog pludselig 12 beboede reder. Vonsild husede i 1860-erne 11 reder blot på to sammenbyggede gårde. I 1890 var der næppe 11 reder i hele byen, og i 1926 var der kun 1."

År	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1963
Par	20	15	18	19	22	22	20	15	12	10
Unger	59	15	34	39	35	33	30	29	18	19
Enlige	6	8	1	2	1	0	2	5	3	2
År	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977
Par	10	8	6	5	4	3	3	2	2	3
Unger	6	19	8	16	4	6	4	0	4	5
Enlige	2	1	1	0	2	0	0	0	1	0
År	1978	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
Par	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0
Unger	0	0	0	5	4	3	4	0	2	0
Enlige	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1

Opgørelse over ynglebestanden af Hvid Stork i Vejle Amt, 1952 – 1994.

(par - unger - enlige)

Det sidste ynglepar i Vejle Amt (Godrum, Fovslet) fik 2 unger på vingerne i 1996. I 1997 var der en enlig hun. Desuden var der et "tamt par", som fik 2 unger, som forlod stedet den 27/8.

I de første juni-dage i 1988 oplevede vi en sand invasion af storke – den største forekomst i amtet i "nyere tid": 1/6 9 mellem Haldrup og Søvind, 2/6 16 Staksrode samt 11 Haldrup og 3/6 18 Barrit.

De største forekomster siden har været: 1/5 1994 7 Jelling, 8/7 1994 9 SV Trelde, 13/9 1998 6 S Lille Hansted Ådal og senere samme dag rastende ved Ulbækgård Naturcenter (yngleparret fra Vesløs med årets 4 unger).

År	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Antal	35	24	19+	11+	33+	22+	18	11	4	5-7

Forekomst af Hvid Stork i Vejle Amt, 1994 – 2003.

Pibesvane *Cygnus columbianus*

Træk- og vintergæst fra Nordrusland.

Winge (1903) nævner et knoglefund (stykke af et skinneben) af *Cygnus minor*, som er fundet inderst i Kolding Fjord i forbindelse med opmudringer i sidst i 1800-tallet. Antageligt fra Stenalderen.

5/3 1967 1 Rands Fjord
 9/3 1969 9 Rands Fjord
 29/11 1977 1 Fårup Sø

De største forekomster herefter er: 10/11 1984 50 trækkende V Dollerup Sø, 27/10 1986 50 trækkende N Kolding, 6/3 1992 47 ad. + 7 2k Uldum Kær, 11/3 1992 77 ad. + 12 2k Uldum Kær, 16/3 1992 80 ad. + 11 2k Uldum Kær, 24/3 2001 66 Grønbjerg, Give, 21/3 2002 53 Galtkær og 23/3 2002 67 Galtkær.

År	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985
Antal	1	-	-	-	11	31	20	80	80+
År	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994
Antal	65	41	45	101	33	36	130+	54	81
År	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Antal	84	66	83+	91+	59+	46	232	215+	125+

Forekomst af Pibesvane i Vejle Amt, 1977 – 2003.

Sædgås *Anser fabalis*

Træk- og vintergæst fra det nordlige Fennoskandinavien og Nordrusland mod øst til Ural.

Samtlige data:

8/10 1906 16 VNV + 10 NV Kolding (Hagerup, DOFT, 2. årg., 1907-08)
 21/10 1906 2 flokke SV Kolding (Hagerup, DOFT, 2. årg., 1907-08)
 23/10 1906 4 SV Kolding (Hagerup, DOFT, 2. årg., 1907-08)
 26/10 1906 8 SV Kolding (Hagerup, DOFT, 2. årg., 1907-08)
 9/10 1910 8 SV Kolding (Hagerup, DOFT, 5. årg., 1910-11, p. 159)
 12/10 1910 32 VSV + 18 V + 11 NV Kolding (Hagerup, DOFT, 5. årg., 1910-11, p. 159)
 4/10 1911 12 (?) SV Kolding (Hagerup, DOFT, 6. årg., 1911-12, p. 163)

1/3 1980 6 N Fårup Sø
 10/1 1981 10 V Fårup Sø
 31/1 1982 10 Ølholm Kær
 7-11/12 1982 10 Holt, Vamdrup
 20/11 1983 1 Ølholm Kær
 7/11 1984 1 Fovslet
 17/11 1984 12 SØ Kobbelskoven
 3/10 1985 hørt trække over Vorsø
 3/1 1986 1 S Mørup
 12-16/2 1986 13 Vorsø
 12/2 1986 250 V Kolding (?)
 1/1 1987 14 S Dollerup Sø

9/2 1987 1 Gudenåen ved Nedenskov
20/2 1987 8 Solkær Å
24-25/3 1987 3 Tørring Kær
29/3 1987 1 N Søvind
7/11 1987 11 SV Dollerup Sø
25/11 1987 5 V Dollerup Sø
5/2 1988 26 N Horsens
3/11 1988 1 Vorsø
31/12 1988 5 V Dons Søndersø
11/11 1990 13 Dollerup Sø
30/11 1990 2 Ø Brædstrup
4/3 1991 5 ØNØ Vejle Søndermark
7/12 1991 3 Rands Fjord
18/12 1991 17 Vorsø
9/1 1992 4 Uldum Kær
1/2 1992 1 Rands Fjord
14/2 1992 4 N Dollerup Sø
16/5 1992 1 Flasken, Endelave
28/11 1993 4 Egum
10/12 1994 18 V Dollerup Sø
9/2 1995 1 Uldum Kær
10/3 1995 3 Horskær, Vamdrup
28/12 1995 15 SØ Vejle Søndermark
12/1 1996 14 Uldum Kær
14/1 1996 8 Brude Sø
27/1 1996 25 Vorsø
14/1 1997 2 Rands Fjord
22/2 1997 1 N Bjørnsknude
1/1 1998 22 V Børkop
12/5 1999 3 Vorsø
13/1 2000 23 Donssøerne
12/1 2002 1 Åstruplund
8/3 2003 1 Vindelev
13/3 2003 2 N Staksrode
6/12 2003 2 overflyvende Vorsø

Blisgås Anser albifrons

Træk- og vintergæst fra Nordrusland. Meget sjælden sommergæst.
Samtlige data:

28/3 1979 5 Uldum Kær
4/10 1982 2 trækkende Erritsø
5/3 1983 1 Dons Søndersø
24/3 1984 2 Skærsø
12 + 27/7 1984 1 Donssøerne (sandsynligvis undsluppen fra fangenskab eller skadet)
9-10/3 1985 1 Nørrestrand
17/3 1985 1 Bygholm Sø
7/4 1985 1 Brigsted

23/2 1986 1 Hastrup Sø
13/10 1986 2 Vorsø
24-25/10 1987 2 Nørrestrand
22/1 1989 6 Hjarnø
11/2 1989 2 NNØ Nørrestrand
17/3 1989 1 Dons Nørresø
5/5 1990 1 Rands Fjord
30/12 1990 1 Brigsted (anskudt)
16/4 1991 1 SV Vejle Inderfjord
4-9/1 1992 1 Uldum Kær
10/1 1992 1 Åle
5-6/3 1992 1 Pjedsted
3/5 1992 1 Rands Fjord
5-15/10 1992 1 Nørrestrand
10/12 1992 5 S Eltang Vig
17-30/1 1993 2 Nørrestrand
27/2 – 14/4 1993 1 Nørrestrand
15 + 26/3 1993 1 Dons Nørresø
25-27/11 1994 1 Nørrestrand
3/12 1994 1 Rands Fjord
16/10 1995 30 V Horsens
14/1 1996 1 Brude Sø
31/3 1998 1 Uldum Kær
28/9 1998 180 SV Bollerstien
29/9 1998 100 V Dallerup
29/9 1998 22 SV Ternevej, Horsens
23/4 1999 1 Donssøerne
28/4 1999 1 Dons Søndersø
29/1 2000 2 Hansted
31/1 2000 2 Egebjerg Enge
30/3 2000 1 Dons Søndersø
25/6 2000 1 Egebjerg Enge (sammen med grågæs – fløj udmærket)
2/7 2000 1 Nørrestrand (samme som foregående)
1/5 2001 1 Dons Nørresø
24-26/10 2001 2 Dollerup Sø
13/2 2002 1 N Rosenvold
28/3 2002 2 overflyvende Staksrode
14/4 2002 32 Klosterkær
29/11 2003 2 Nørrestrand
6/12 2003 3 N Bjørnsknude

Sort Glente *Milvus migrans*

Sjælden træk- og sommergæst fra Mellem- og Sydeuropa.

Samtlige data:

8/6 1970 1 Fovslet (Danske Fugle, 23. årg., 1971)
30/7 1970 1 Bryrup (Danske Fugle, 22. årg., 1970)

15/5 1½1971 1 Jelssøerne (Danske fugle, 23. årg., 1971)
6/6 1976 1 NV Snaptun
30/8 1976 1 Svanemosen
4/5 1977 1 Fårup Sø
4/5 1977 1 Vonsild
18/5 1977 1 Fårup Sø
25/4 1980 1 Rugballe Mose
29/4 1980 1 Hygum
14/7 1984 1 Munkebjerg
9/9 1984 1 ad. Rands Fjord
7/5 1985 1 Frederikshåb Plantage
8/6 1986 1 imm. Østbirk
1/5 1987 1 Søvind
30/5 1988 1 Håstrup
29/5 1990 1 Potmose
18/5 1991 1 Dons
6/4 1992 1 Bollerstien/Horsens Losseplads
17/5 1992 1 Vejle Losseplads
8-9/6 1992 1 Rands Fjord
22/6 1993 1 Nørrestrand
20/8 1994 1 Nørrestrand
6/5 1995 1 Sletkær Grusgrav
28/8 1995 1 SV Rosenvold
2/9 1995 1 Vejle Losseplads
10/8 1996 1 SV Juelsminde
15/4 1998 1 Holtum
25/4 1998 1 Kulsø
26/4 1998 1 VNV Holtser Hage
30/5 1998 1 Løsning
30/7 1999 1 S Trelde
15/4 2000 1 NNV Vejle Søndermark
15/5 2000 1 Ø Dollerup Sø
27/7 2000 1 overflyvende Dollerup Sø
26/4 2001 1 Ø Stenderup Nørreskov
3/5 2001 1 Ø Grejsdalen
17/5 2001 1 S Molger
9/7 2001 1 Sortebjerg, Dollerup
1/5 2002 1 N Staksrode
22/5 2002 1 S Staksrode
7/5 2003 1 N Staksrode
26/5 2003 1 Dollerup Sø (LK) – fouragerende kl. 12.10 – 12.25, hvorefter den forsvandt mod syd

Havørn *Haliaeetus albicilla*

Ynglede fåtalligt indtil slutningen af 1890'erne, hvorefter arten i næsten 75 år stort set ikke forekom i amtet. Fra slutningen af 1980'erne taget til i antal, hvilket utvivlsomt hænger sammen med, at arten er genindvandret til landet og nu yngler flere steder.

Winge (1903) nævner et knoglefund (stykker af en overarm) af *Haliaëtus albicilla*, som er fundet inderst i Kolding Fjord i forbindelse med opmudringer i sidst i 1800-tallet. Antageligt fra Stenalderen.

Herschend (1884) skriver: "Havørnen er ikke meget almindelig her i Egnen; af Steder, hvor den bygger Rede, kan nævnes Stensballegaard, Palsgaard, Rathlousdal og Gyllingnæs Skove. Cand. Pharm. H. Faber fandt dens Æg i Stensballe og Palsgaard Skove, sidstnævnte Sted den 5te April 1881 og 17de Marts 1882. I Hovedskov skjød Proprietær Chr. Søltoft den 22de Januar 1879 en gammel Hun, der vejede 10 Pd. og i Vingefang maalte 82 Tommer."

Collin (1888): "Blandt dens Ynglesteder her i Landet kan anføres Rathlousdal Skov v. Aarhus, Stenderup Skov v. Kolding og Gyllingnæs i Jylland. ... I Bigum Skov v. Tjele yngler der hvert Aar 1 à 2 Par; ligeledes i Stensballe- og Palsgaard Skove. I sidstnævnte Skov fandtes der i 1882 allerede d. 12. Marts Æg i Reden; ifølge den derværende Skovriders Angivelse har Havørnen bygget i denne Skov i over 40 Aar."

Faber (1898) skriver bl. a.: "I en lang Aarrække har Ørnen haft sin Yngleplads i Brakø Skov ved Stensballegaard; flere Gange har den skiftet Plads, naar man har forstyrret den. Den Rede, jeg har klatret op i, sidder i en Højde af c. 80 Fod over Jorden. Jeg besteg den sidst den 17. Marts 1892, og en af Ørnene laa i den, da jeg nærmede mig Træet, men der var desuagtet ikke Æg i Reden,I en anden af Skovene i Horsens-egnen har Havørnen ligeledes ynglet i mange Aar nemlig den 600 Td. Land store Palsgaard Skov, der ligger paa en Landtunge ud i Havet og hvor Ørnen har et mere fredlyst Opholdssted end i Stensballe Skov. Her fandt jeg første Gang Reden i 1877, bygget forholdsvis lavt i en svær Eg, men den Gang manglede jeg Evne og Redskaber til at stige derop. Den 3. April 1881 foretog jeg Opstigningen ved Hjælp af Jernskruer og fandt da 2 stærkt gullige Æg. Næste Aar besøgte jeg Reden allerede den 12. Marts; da var der et Æg, og den 16. Marts var der 2 Æg, som nok er det almindelige Tal.....til endnu en Gang at se Ørnen og dens Bo og tog den 16. Marts 1890 derud. Det varede længe, førend jeg fandt Reden, da den gamle, jeg kjendte, var forsvunden tilligemed Træet. Endelig traf jeg paa den nye Rede, denne Gang bygget en Del højere oppe i en svær Bøg, og jeg forefandt 2 smudsighvide Æg i den. Foruden disse 2 Ynglesteder har jeg ikke fundet den i Horsens-Vejle-egnen, kun af og til set den strejfende f. Ex. den 29. Januar 1882 over Rosenvold Skov, hvor den siges at have ynglet for mange Aar siden."

Kristensen (1899): "Hvidhalet Havørn (*Haliaëtus albicilla* L.) blev ifølge "Horsens Folkeblad" Nr. 123 1898 skudt den 31. Maj s. A. paa Vorsø i Horsens Fjord af en Bestyrer Povlsen. Den maalte 3½ Alen fra Vingespiuds til Vingespids. Dyret saa glubsk ud med sit krumme Næb og sine vældige Klør."

Jørgensen (1906): "Og som Konge over det hele har jeg mangen Gange set Havørnen (*Haliaëtus albicilla*) sidde paa Toppen af Skrænten paa Vorsøkalv; den har siddet midt i sit Spisekammer, betragende alt med et opmærksomt Blik og hvilende ud efter Anstrengelserne for at skaffe Føden til Ungerne, som den havde en 1000 Alen derfra i Stensballeskov. Sidst den yngledede der, var i 1895; Reden sidder endnu velbevaret i en høj Bøg, endskønt den har taget mod mange Storme."

Skovgaard (1927): "Ved Stensballegaard yngledede den i Brakør Skov, hvor den havde ynglet i flere Aar fra ca. 1845. Fra denne Rede blev i 1871 1 Unge taget til Zool. Have. ... og den yngledede sidst der 1895. I Boller Skov er Ynglepladsen allerede opgivet 1878. ..."

Okt. 1918 1 ad. hun skudt Sdr. Vissing (Poulsen 1938/Skotte Møller 1970)

Pr. feb. 1965 1 Vejle Fjord

Samtlige data, 1975 – 2003:

25-26/12 1975 1 1k Vigen Skov
21/12 1976 - 1/7 1977 1 Grejsdalen
9/4 1979 1 2k Rands Fjord
14/4 1979 1 2k Rands Fjord
15/4 1979 1 2-3k Kobbelskoven
Marts 1980 1 Egtved Å
21/9 1980 1 juv. Voervadsbro
26/10 1980 - 31/3 1981 1 juv. Salten Langsø
22/5 1981 1 imm. Salten Langsø
3/6 1982 1 2-3k Stallerup Sø
27/1 1985 1 juv. Kolding Fjord
28/2 1985 1 usp. Mossø
22/4 1985 1 Dollerup Sø
Pr. feb. 1986 1 Stenderup Hage
Juli 1988 1 Juelsminde
28/10 1988 1 usp. Tønning
26/11 1988 1 2k Rørbæk Sø
24/5 1989 1 NØ Trelde Næs
21/1 - 24/2 1990 2 imm. Salten Langsø
1/4 1990 1 imm. Haldrup
20-21/5 1990 1 imm. Drenderup
16/11 1990 - 3/3 1991 1 ad. Salten Langsø
Ult. maj 1991 1 ad. Salten Langsø
24/9 1991 1 imm. Vorsø
19/11 1991 1 Klejs
22/12 1991 - 8/2 1992 1 ad. Salten Langsø
16/6 1992 1 imm. Rørbæk Sø
12/12 1992 1 Harrild Hede
Ca. 1/12 1992 - 11/3 1993 1 ad. + 1 imm. Salten Langsø
3-4/4 1993 1 imm. Rands Fjord
14-22/1 1994 1 ad. + 1 3k Salten Langsø
7/5 1994 1 ad. Dons Søndersø
17/9 1994 1 imm. S Bjørnsknude
30/4 1995 1 imm. Rands Fjord
3/2 1995 1 ad. Salten Langsø
4/2 1995 1 ad. Salten Langsø
5/2 1995 1 2k Rørbækgård
13/2 1995 1 ad. Salten Langsø
19/2 1995 1 ad. Salten Langsø
30/4 1995 1 imm. Rands Fjord
12/7 1995 1 imm. Vorsø
1/2 1996 1 2k Juelsminde
10/2 1996 1 ad. Salten Langsø
13/3 1996 1 Husodde

14/3 1996 1 2k Vorsø
19/4 1996 1 ad. Salten Langsø
8-12/5 1996 1 4k Salten Langsø
9/5 1996 1 imm. Klostermølle
9/6 1996 1 imm. Salten Langsø
15/12 1996 1 ad. Salten Langsø
26-27/12 1996 1 ad. Vorsø
8/1 1997 2 (ad. + usp.) Vejle Fjord
19/1 1997 1 Kolding Inderfjord
21/1 1997 1 Nagbøl
11/2 1997 1 ad. Salten Langsø
15/2 1997 1 Vorsø
27/4 1997 1 Ø Vorsø
28/4 1997 1 Nørrestrand
6/5 1997 1 Horsens
30/8 1997 1 V Rands Fjord
18/10 1997 1 VNV Bramdrupdam
11/11 1997 1 S Herslev
17/12 1997 1 Vorsø
3/1 1998 1 2k Rørbæk Sø
6/1 1998 1 Gudsø Vig
13/1 1998 1 imm. Vorsø
13/3 1998 1 Vorsø
21/3 1998 1 imm. Salten Langsø
19/6 1998 1 3-4k N Rævebjerg
27/7 1998 1 ad. V Dons Nørresø
7+9/8 1998 1 ad. Rands Fjord
16/8 1998 1 Ferup Skov (halefjer fra ungfugl fundet)
25/4 1999 1 4k Rørbæk Sø
7-29/8 1999 1 1k Vorsø
15/9 1999 1 1k Møllegrunden
19/9 1999 1 1k S Stallerup Sø
3/10 1999 1 1k Stenderup Hage
15/10 1999 1 1k SV Rosenvold
16/10 1999 1 imm. V Nørrestrand
17/10 1999 1 1k indtrækkende/V Bjørnsknude
18/10 1999 1 1k Salten Langsø
14/11 1999 1 imm. Rands Fjord
8/4 2000 1 2-3k Rands Fjord
12/4 2000 1 imm. N Uldum Kær
21/4 2000 1 imm. Lilballe Skov
7/5 2000 1 Galtkær
12/8 – 22/10 2000 2 Dollerup Sø
23/9 2000 1 Ø Sebberup
18/10 2000 1 S Givskud
31/12 2000 1 1k Øster Nykirke
18/2 2001 1 ad. Salten Langsø
24/5 2001 1 2-3k Dollerup Sø
14/6 2001 1 2-3k Dollerup Sø

22/7 2001 1 Rands Fjord
 31/7 2001 1 ad. Dollerup Sø
 2-4/9 2001 1 Rands Fjord
 24/10 2001 1 sub-ad. Vorsø
 28/10 2001 1 Rosenvold (sås indtrækkende over Trelde Næs)
 26/12 2001 1 juv. NØ Dalby Møllebæk
 20/1 2002 1 imm. Mossø
 20/3 2002 1 sub-ad. Donssøerne
 28/3 2002 1 2-3k S Mejsling Skov
 28/3 2002 1 5k Vorsø
 31/3 2002 1 S Ørnstrupvej, Horsens
 7/4 2002 1 ad. Rands Fjord
 13/4 2002 1 V Gårslev
 26/4 2002 1 2k Dons Søndersø
 17/8 2002 1 imm. V Fousing
 28/9 2002 1 ad. Vorsø
 1/10 2002 1 overflyvende Vorsø
 9/10 2002 1 juv. Stensballe
 15/10 2002 1 Vorsø
 31/1 2003 1 overflyvende Addit Skov
 20/2 2003 1 3k+ N Teglværksvej, Løsning
 25/2 2003 1 ad. Klostermølle
 28/2 2003 1 2k V Galtkær
 7/4 2003 1 2k Rørbæk Sø
 13/4 2003 1 2k N Nørrestrand
 17/4 2003 1 3k V Staksrode
 21/4 2003 1 ad. N Høll
 25/6 – 26/7 2003 1 Vorsø
 19/10 2003 1 SV Fredericia
 22/10 2003 1 juv. Klostermølle
 8/12 2003 1 ad. Klostermølle

År	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983
Antal	-	1	-	1	-	3	3	1	1	-
År	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993
Antal	-	3	1	-	3	1	5	4	4	1
År	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Antal	4	4	8	13	9	10	8-9	8-9	13	13+

Forekomst af Havørn i Vejle Amt, 1975 – 2003.

Hedehøg Circus pygargus

Wielandt (1924): ”Ynglende årligt i Nørlund og Gludsted Pl.”

Schougaard (1920-24): ”i de sidste 4-5 Aar Par i Kongsø Pl. og flere Par i Gludsted Pl. Strejfer vidt i Egnen. 1 sk. 1916 paa Kongsø Pl., havde en Hugorm i Mavben.”

Jespersen (1947) angiver, at der ynglede enkelte (2-3 par) på Randbøl Hede i 1940'erne, samt at hedehegen ynglede i Midtjylland, blandt andet Gludsted, Nr. Snede og Ejstrup i 1930'erne og 1940'erne.

6/6 1954 iagtt. Randbøl Hede
5/5 1965 1 Kolding Inderfjord
17/5 1977 1 ♀ Dridekær

Samtlige data, 1980 – 2003:

6/8 1982 1 ♀ Kalhave
1/6 1984 1 ♀/2k Dollerup Sø
14/8 1984 1 ♀ Vonsild Skov
14/8 1984 1 ♂ Brændsmade
8/5 1986 1 ♀ Dollerup Sø
5/7 1988 1 ♀ Tinnet Krat
8/5 1989 1 ♀ Nørrestrand
5/6 1991 1 Spettrup
14/5 1992 1 ad. ♂ + 2 ad. ♀♀ Nørrestrand
15/5 1992 1 ad. ♂ Nørrestrand
17/5 1992 1 ad. ♂ Nørrestrand
Efterår 1991 1 1k død Fovslet Skov
1/5 1993 1 ad. ♂ Elling Skov
1/5 1993 1 ♀ Sole Kær
1/5 1993 1 ad. ♂ Bollerstien
2/6 1993 1 ♀ Håstrup
5/6 1993 1 ♀ Vejle Søndermark
12-16/8 1993 1 1k Dollerup Sø
22/8 1995 1 ♀/1k S Bølling Søndermark
23/8 1995 1 1k Dollerup Sø
4/5 1996 1 ad. ♀ Uldum Kær
24/5 1997 1 ♀ Ø Holtser Hage
31/5 1997 1 ♀ N Øvre, Endelave
7/9 1997 1 1k S Galtkær
7/9 1997 1 "brun" SSV Rosenvold
3/5 1998 1 ♀ N Borre Odde
18/7 1999 1 2k ♂ Randbøl Hede
2/5 2000 1 ♀ Ø Uldum Kær
8/7 2002 1 ad. ♂ Galtkær
3/8 2002 1 ♀ Oens
21/8 2002 1 Teglværksvej, Løsning
4/5 2003 1 ad. ♂ Staksrode
11/5 2003 1 2k N Barritskov
27/6 2003 1 ♂ Tørskind
28/6 2003 1 ad. ♂ Egtved

Vandrefalk Falco peregrinus

Sjælden - fåtallig trækgæst, sjælden vintergæst og meget sjælden sommergæst fra Fennoskandien og Rusland. Siden begyndelsen af 1990'erne tiltaget i antal, således at arten nu ikke mere kan kaldes decideret sjælden i amtet.

6/8 1885 1 ♂ skudt Ejstrup (Larsen, 1901)
 21/11 1891 1 skudt Horsens (Faber, 1898/Kristensen, 1899)
 5/10 1899 1 ♀ skudt Gludsted (Larsen, 1901)

Wielandt (1924): ”T, set i Palsgaard Skov.” (T = iagttaget enkelte eller faa Gange)

22/2 1932 1 Dons Søndersø (Holm, DOFT, 28. årg., 1934)
 13/3 1936 1 ♂ død 6. km v. f. Horsens (ringmærket 21/6 1933, Halland, Sverige) (Adelholt, 1958)

28/8 1961 1 Vamdrup
 14/11 1970 1 Stallerup Sø
 10/1 1971 1 Stallerup Sø

Iagttagelser af Vandrefalk i Vejle Amt i perioden 1974 – 2003 fremgår af nedenstående oversigt:

År	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983
Antal	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-
År	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993
Antal	1	3	-	1	-	1	3	8	9	6
År	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Antal	11	18	16	13	20	7	6	12	23	29

De fleste forekomster af Vandrefalk drejer sig om et enkelt individ. Ved følgende lejligheder er der dog iagttaget 2 eller 3 fugle: 12/4 1998 3 NV Holtser Hage (2k kl. 0813, ad. kl. 1108 og ad. ♀ kl. 1420), 29/8 2001 2 ad. (♂ + ♀) rastende Rosenvold, 6/11 2002 2 Vorsø og 11/1 2003 2 Vejle Havn.

Stationære Vandrefalke i Vejle Amt er ikke hverdagskost. Vorsø har dog flere gange haft besøg af Vandrefalke, som har holdt omkring øen til i kortere eller længere tid. En enkelt stationær fugl (ad. han), som blev iagttaget meget af mange ornitologer, holdt til på Vejle Havn (primært omkring DLG-bygningen) i vintrene 2001/02 og 2002/03. Den sås første gang ved Hornstrup nord for Vejle den 20/12 2001. Herefter sås den i havneområdet 23/12 2001 – 6/1 2003. 23/12 2002 sås en overflyvende fugl ved Vejle Fjord-broen, og 28/12 2002 – 16/2 2003 sås igen en ad. han omkring DLG-bygningen på havnen (skulle have været der siden slutningen af november). Fuglen, som sås begge vintre, var ringmærket, men det lykkedes ikke at få aflæst ringen. Der er dog rimelig sand-synlighed for, at det var samme fugl begge vintre. 2/11 2003 sås en fugl kortvarigt ved DLG-bygningen.

En enkelt fugl har antageligt tilhørt racen *calidus*: 28/10 1995 1 k (♀) Ø Rosenvold.

Lærkefalk *Falco subbuteo*

Sjælden – fåtallig træk- og sommergæst. Meget sjælden ynglefugl. Fra 1979 - 2003 er Lærkefalken iagttaget årligt i amtet, hvilket især skyldes øget aktivitet på egnede træksteder (f. eks. Holtser Hage, Rosenvold, Solkær Enge m.m.) såvel om foråret som om efteråret.

Faber (1898) skriver: "Den 11/5 78 saa jeg et Par Lærkefalke i Serritslevgaard Skov ved Horsens, hvor de fløj fra Rede til Rede i Raagecolonien og gjorde sig tilgode med Æggene. Den 16/5 92 fandt Th. Jørgensen dens Rede med 3 Æg i Bygholm Skov ved Horsens."

Kristensen (1899) : "I Efteraaret 1892 blev der skudt to Exemplarer i Uldum Egnen."

31/3 1900 1 Tyrsted (Georgsen 1901) - jagede lærker - Alene tidspunktet mere end antyder, at denne iagttagelse beror på en fejlbestemmelse.

24/7 1918 1 ad. ♂ skudt Palsgård (Wielandt 1924)

21/8 1918 1 ung ♂ skudt Palsgård (Wielandt 1924)

1920 rede med 3 æg Palsgård (Wielandt 1924)

Wielandt (1924) angiver desuden, at arten ynglede årligt i Palsgård Skov.

Ca. 1926 - 34 1 Dons Søndersø (Axel Holm, 1934)

21/9 1964 1 SV Tirsbæk Strand

17/4 1974 1 Viuf Skov

7/9 1976 2 Endelave

1/6 1976 1 Dollerup Sø

28/4 1979 1 Baggesholm

16/9 1979 1 As Kær

1/10 1979 1 Jelling

År	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991
Antal	1	4	8	7	5	10	3	6	4	5	5	4
År	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Antal	8	9	3	5	14	6-7	23-24	9	7	11	26	14-15

Forekomst af Lærkefalk i Vejle Amt, 1980 – 2003.

De største obs. i perioden 1980 – 2003 var: 8/9 1999 4 SV Rosenvold, 1/9 2002 7 SV Rosenvold og 5/9 2002 4 SV Rosenvold.

Ynglefund: 1 par, som fik 2 og 1-2 unger på vingerne, i den sydlige del af amtet i 1996 og 1997.

Aftenfalk Falco vespertinus

Sjælden – fåtallig træk- og sommergæst fra Øst- og Sydeuropa samt Rusland.

Samtlige data:

11/9 1980 1 juv. Donssøerne

26/5 1981 1 ad. han Slagballe Bakker

1/6 1985 1 ad. hun Uldum Kær

13/8 1985 1 ad. hun Nørrestrand

2/5 1987 1 han Egeskov

10/5 1988 1 han Dollerup Sø
13/8 1989 1 1k Dons
26/8 1989 1 han Endelave
3/9 1989 1 han Halle Sø
21/9 1989 1 ad. hun Kobbelskoven, Kolding
7/5 1990 1 Nørlund Plantage
13/6 1990 1 hun/2k Dollerup Sø
19/10 1990 1 han Hjarnø
14/5 1992 2 2k hunner Vejle Søndermark
16/5 1992 1 ad. hun Horsens
2/6 1992 1 2k Harrild Hede
17/9 1992 1 2k+ hun Rosenvold
4/5 1993 1 hun Hannerup Skov
19/5 1993 1 2k Holtser Hage
20/5 1993 1 ad. han Holtser Hage
17/8 1993 1 ad. han Rosenvold
25/5 1995 1 2k hun N Holtser Hage
5/9 1996 1 1k S Træskohage
21/5 1997 1 han Kongens Kær
29/7 1997 1 2k han R -> SV Nørrestrand
23/5 1998 1 ad. han N Holtser Hage
29/7 1998 1 ad. han overflyvende Vorsø
28/5 1999 1 2k hun R -> N Øvre, Endelave
21/8 1999 1 2k+ han NØ Vejle Havn
22/8 1999 3 hanner SV + 1 1k SV Rosenvold
28/8 1999 1 ad. han SV Solkær Enge
10/5 2002 1 2k hun N Dollerup Sø
20/5 2002 1 2k hun Dollerup Sø
29/8 2002 1 1k SV Rosenvold
30/8 2002 1 ad. han S + 1 1k S Rosenvold
1/9 2002 1 2k hun SV + 1 1k SV Rosenvold
4/5 2003 1 2k hun N Staksrode
2/9 2003 1 2k R – N Nørrestrand

Urfugl Tetrao tetrix

Faber (1898): ”Paa Hederne i Vesteregnet findes hist og her Urhøns i mindre Antal. I Jagttiden komme enkelte Haner ud til Vildthandlere i Byen.”

Wielandt (1924): ”YÅ i Gludsted og Nørlund Plantager.” (YÅ = ynglende hvert år)

Madsen (1931): ”Der var ualmindelig mange Urfugle, *Lyrurus tetrix britannicus*, at høre efter danske Forhold.” – uddrag af referat fra besøg på Randbøl hede den 25/5 1931. (DOFT, 26. årg., 1931)

- **Uddød** -

Ynglede tidligere på Randbøl Hede. De sidste observationer var i 1992, hvor der blev fundet en død han og set en levende hun.

På Harrild Hede sås 3 hanner i 1974, og på Nørlund Hede sås 2 hanner i 1976.

	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982
Han	10	8-10	5	10+	5-6	2+	7	2	1	4
Hun			1	flere						2
	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
Han	6	6-7	6-7	6-8	6-8	4	4-5	1-2	2	1
Hun	3			2+	2		2	1		1

Forekomst af Urfugl på Randbøl Hede, 1973 – 1992.

Trane *Grus grus*

Sjælden trækgæst i Vejle Amt. Meget sjælden sommer- og vintergæst. Fra slutningen af 1990'erne ynglefugl i Ribe Amt, få km fra amtsgrænsen til Vejle Amt.

Larsen (1901): ”Nogle Stkr. af denne sjældne Fugl saas i Gludsted Mose i 1874.”

Største forekomster: 10/10 1977 7 Dridekær Mose, 8/5 1982 7-8 Klosterkær, 3/6 1982 2 Højen, 29/9 1984 7 Endelave, 5-6/5 1987 4 Hjarnø, 4-5/7 1987 9 Svanemosen/Ødis, 20/5 1990 5 Brigsted, 24/10 1996 20 Ø Hosby, Juelsminde, 7/4 1997 4 N Tiufkær, 10/8 1997 4 Skærsø, 23/8 1997 4 (2 ad. + 2 1k) Skærsø (har ynglet i den nærliggende Husted Mose i Ribe Amt), 17/11 2003 14 S Ringive

År	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983
Antal	-	-	-	7	-	-	6	-	9-10	2
År	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993
Antal	9	1	3	17	-	2	6	-	3+	2
År	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Antal	2	-	20	8	12	8	15-16	9	4	24

Forekomst af Trane i Vejle Amt, 1974 – 2003.

Vagtel *Coturnix coturnix*

Sjælden træk- og sommergæst fra Mellem- og Sydeuropa, eventuelt Skandinavien. Meget sjælden, uregelmæssig ynglefugl.

Kan visse år optræde i invasioner (1964, 1972, 1976, 1989, 1990 - jf. KMO: Danmarks fugle).

Seneste store invasioner, som virkelig kunne mærkes i Vejle Amt var i 2000 og 2002, men arten er tilsyneladende taget til i antal i de senere år.

Samtlige data:

14/9 1881 kuld med 9 æg Nissumgårds Mark, Horsens (Faber, 1898)

1890 rugende (på udlægsmark) Hesselballe (Kristensen, 1899)

1/5 1891 1 (død under telegraftråd) Konstantia Kro (Kristensen, 1899)

1892 1 skudt Hjortsvang Mark (Kristensen, 1899)

22/6 1893 rede med 15 æg Stensballegård, Horsens (Faber, 1898)

Ca. 1894 skudt V. Ørum (Kristensen, 1899)

5 + 8/10 1952 2 Tiufkær (begge fanget og dræbt af hund)

8/7 1980 2 Binderup
17/8 1980 1 ♂ Bisholt
11/6 1981 2 Endelave
9/10 1983 1 Donssøerne
28/6 1984 1 Farre
9/7 1986 1 hørt Hvirring
21-22/5 1987 1 Søvind
9/5 1989 1 Dollerup Sø
8/6 1989 1 Nøttrup
20-22/6 1990 1 syng. Dollerup Sø
23/8 1990 2 Nøttrup
9/7 1991 1 hørt Ferup Skov
10/7 1992 1 hørt Søvind
30/5 1993 1 ♂ Nøttrup
16-17/6 1993 1 ♂ Dollerup Sø
21/8 1993 1 Rands Fjord
8/6 1994 1 syng. Krollerup
11/6 1994 1 syng. Kragelund Fælled
17/6 1994 1 syng. Haurum
26/6 – med. juli 1994 1 syng. Nøttrup
2/7 1994 1 syng. Trudså
4/6 1995 1 syng. mellem Ferup og Jordrup Skov
20/6 1995 1 syng. Halle Sø
30/5 – 1/6 1996 1 syng. Tiufkær N
3/6 1996 1 syng. Tiufkær S
5/6 1996 1 syng. Haldrup
11/6 1996 1 syng. Tiufkær NØ
21/6 1996 1 syng. Håstrup
19/5 1997 1 syng. Tinnetgård, Nørre Tinnet
11-12/6 1997 1 syng. Vamdrup
11/6 1997 1 syng. Ravningbroen, Vejle Ådal
19/6 1997 1 syng. Teglværksvej, Løsning
4/7 1997 1 syng. Tiufkær
8/8 1997 1 syng. Dollerup Sø
15/8 1997 1 syng. Haurum
10/5 1998 1 syng. Hjarnø
22/5 1998 1 syng. Tiufkær
24/5 1998 2 syng. Tiufkær
30/5 1998 1 syng. Tiufkær
8/6 1998 1 syng. Tiufkær
21/5 1999 2 syng. Tiufkær
4/6 1999 1 syng. Langfredags Mose, Horsens
12/6 1999 1 syng. Mejsling
17/6 1999 1 syng. Hedensted
19/6 1999 2 syng. Ammitsbøl Skov
27/6 1999 1 syng. Gelballe
7/7 1999 1 syng. Kørup
11/7 1999 1 syng. Tiufkær
11 - 14/8 1999 1 syng. Trelde

21/5 2000 1 syng. Fyel Grusgrav
30/5 – 2/6 2000 1 syng. Dollerup Sø
12/6 2000 1 syng. Vandet
13-18/6 2000 1 syng. Hvejsel
17/6 2000 1 syng. Tiufkær
18/6 2000 1 syng. Uldum Kær
19/6 2000 3 syng. Haurum
29/6 2000 2 syng. Viuf
1-11/7 2000 1 syng. Horskær, Vamdrup
2/7 2000 1 syng. Dollerup Sø
3/7 2000 3 syng. Krollerup
5/7 2000 1 syng. Tiufkær
17/7 2000 2 syng. Horskær, Vamdrup
17/7 2000 1 syng. Holt, Vamdrup
23-30/7 2000 1 syng. Tiufkær
27/7 2000 1 syng. Viuf Skov
25/7 2000 1 syng. Viuf
5/8 2000 1 syng. Holt, Vamdrup
6/8 2000 1 syng. Dollerup Sø
15/8 2000 1 syng. Sdr. Bjert
12/6 2001 1 syng. Viuf
17/6 2001 1 syng. St. Dalby
23/6 2001 1 syng. Fredsted
30/6 2001 2 syng. Holt, Vamdrup
30/6 2001 3 syng. Hafdrup, Vamdrup
9/7 2001 1 syng. Ussinggård
9/7 2001 1 syng. Gesager Å
15/7 2001 2 syng. Horskær, Vamdrup
15/7 – 11/8 2001 1 syng. Dollerup Sø
26/5 2002 1 syng. Haurum
27/5 2002 1 syng. Ferup Skov
2/6 2002 1 syng. Kollerup
4/6 2002 2 syng. Agtrup
4/6 2002 2 syng. Solkær Enge
4 + 9/6 2002 1 syng. Horskær, Vamdrup
8/6 2002 3 syng. Ildved Mark
8/6 2002 1 syng. Solkær Enge
14/6 2002 2 syng. Hammer
15/6 2002 1 syng. Dollerup Sø
17/6 2002 3 syng. Solkær Enge
19/6 2002 1 syng. Jordrup Skov
20/6 2002 1 syng. Dollerup Sø
21/6 2002 1 syng. Solkær Enge
7/7 2002 1 syng. Dollerup Sø
9/7 2002 2 syng. Dollerup Sø
11/7 2002 1 syng. Horskær, Vamdrup
11/7 2002 1 syng. Hafdrup, Vamdrup
28/7 2002 3 syng. Horskær, Vamdrup
28/7 2002 1 syng. Hafdrup, Vamdrup

8 – 18/8 2002 1 syng. Solkær Enge
 16/5 2003 1 syng. Brochsminde Skov
 31/5 2003 1 syng. Nyskov, Hjarup
 3/6 2003 1 syng. Tiufkær
 13/6 2003 1 syng. Voervadsbro
 14/6 2003 1 Galtkær
 17/6 2003 1 syng. Dollerup Sø
 13/7 2003 1 syng. Mindstrup
 13/7 2003 1 syng. Dollerup Sø
 20/7 2003 2 syng. Holt, Vamdrup
 22/7 2003 1 syng. Dollerup Sø
 26/7 2003 1 syng. Skjern Å
 5 + 26/8 2003 1 syng. Dollerup Sø

År	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991
Antal	3	2	0	1	1	0	1	1	0	2	3	1
År	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Antal	1	3	5	2	5	7	3	11	25	13	23+	13

Forekomst af Vagtel i Vejle Amt, 1980 – 2003.

Engsnarre *Crex crex*

Meget sjælden yngltrækfugl samt sjælden træk- og sommergæst fra Sydskandinavien, Baltikum, Mellem- og Østeuropa. Almindelig i hele landet frem til begyndelsen af 1900-tallet, hvorefter modernisering af landbruget, med tiltagende opdyrkning af engområder, forårsagede en hurtig tilbagegang i bestanden. Tilsyneladende markant fremgang siden 1999.

Samtlige data:

Faber (1898) skriver: ”I Engene i Vejle-Dalen har jeg ofte hørt dens bekendte Skrig i Yngletiden, uden at det har været mig muligt at faa Fuglen at se, da den har holdt sig skjult i det høje Græs... I Uldum Kjær skal den yngle ret almindelig.”

Kristensen (1899): ”Yngler hvert Aar og er ikke sjælden i Kjæret. Den 20. Juni 1896 modtog jeg et Exemplar, ...Fuglen der blev taget i en gaard, findes opstillet i min Samling.”

Schougaard (1920-24): ”sk. ved Stidsholm Sø.”

Sommer 1933 ”en lille familie” Egtved (Holm, DOFT, 28. årg., 1934)

4/5 1967 1 trafikdræbt Rands Fjord
 20/5 1967 1 syng. Uldum Kær
 23-30/5 1971 2 Gramrode
 3/6 1971 1 nord for Vejle
 15/7 1971 1 Klejs Vesterskov
 Sommer 1972 3 hørt Kolding Å/Tapsøre Mose
 Med. juni 1976 2 Drejens
 2/7 1979 1 Fovslet

Juli 1979 1 Binderup
6-7/7 1981 1 syng. Urlev Enge
25/4 1982 1 syng. Uldum Lær
8/6 1983 1 Dollerup Enge
20/5 1984 1 syng. Bygholm Å
2-18/7 1984 2 hørt Fovslet
15/6 1985 1 syng. Fælleden, Fredericia
18/5 1986 1 Hjarnø
30/8 1986 1 Seljum
28/5 1988 1 hørt Langfredags Mose, Horsens
30/5 – 1/6 1992 1 syng. Nørrestrand
23/5 1993 1 syng. Børkop
28/5 – 2/6 1999 1 syng. Urup Enge, Østbirk
3/6 – 2/7 1999 max. 4 syng. Langfredags Mose, Horsens
12/6 1999 1 syng. Uldum Kær
13/6 – 3/7 1999 max. 4 syng. Dallerup
14/6 1999 1 syng. Hesselballe Kær
28/6 1999 6-8 syng. Langfredags Mose/Dallerup/Dallerup Skov
2/7 1999 1 syng. Dallerup Skov
3/7 1999 1 syng. Lund
26/5 2000 1 syng. Tiufkær
15/6 2000 1 syng. Uldum Kær
18/6 2000 2 syng. Uldum Kær
19/6 2000 1 syng. Nagbøl Søndermose
19/6 2000 2 syng. Uldum Kær
19/6 2000 1 syng. Haurum
21/6 2000 1 syng. Jordrup
21/6 2000 1 syng. Uldum Kær
21/6 2000 1 syng. Alsted Skov
21-23/6 2000 1 syng. Uldum
22-23/6 2000 1 syng. Jordrup
24/6 – 17/7 2000 2 syng. Horskær, Vamdrup
4/7 2000 1 syng. 1 km øst for Uldum
22/5 + 6/7 2001 1 syng. Kolding Å
4/6 2001 2 syng. Kolding Å
10/6 2001 7 syng. Solkær Enge
10/6 2001 1 syng. Rands Fjord
3-4/7 2001 2 syng. Solkær Enge
13/7 2001 1 syng. Jordrup Skov
20/5 2002 2 syng. Solkær Enge
31/5 2002 4 syng. Solkær Enge
4/6 2002 2 syng. Solkær Enge
8 + 9/6 2002 1 syng. Solkær Enge
14/6 2002 5 syng. Solkær Enge, Skibelund – Sdr. Stenderup
14/6 2002 1 syng. Hammer
17/6 2002 1 syng. Solkær Enge
20/6 2002 1 syng. Bredsten
3 – 4/7 2002 1 syng. Dallerup Sø
9 - 17/7 2002 1 syng. Horskær, Vamdrup

20/7 2002 1 syng. Ildved Mark
 4/6 2003 1 syng. Solkær Enge
 6 - 7/6 2003 2 syng. Solkær Enge
 11/6 – 4/7 2003 1 syng. Nagbøl Søndermose
 13/6 2003 1 syng. Solkær Enge
 13 – 17/6 2003 1 syng. Dollerup Sø
 8/7 2003 1 syng. 5 km syd for Kolding
 11/7 2003 2 syng. Haurum
 16/7 2003 1 syng. Haurum
 20 – 21/7 2003 1 syng. Holt, Vamdrup

År	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981
Antal	3	3	0	0	0	2	0	0	2	0	1
År	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
Antal	1	1	3	1	2	0	1	0	0	0	1
År	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Antal	1	0	0	0	0	0	11+	11+	11	10+	8

Forekomst af Engsnarre i Vejle Amt, 1971 – 2003.

Plettet Rørvagtel *Porzana porzana*

Meget sjælden yngltrækfugl. Sjælden, fåtallig træk- og sommergæst fra Sverige og eventuelt Finland og Rusland samt Mellem- og Østeuropa i invasionsår.

2/10 1881 1 skudt Gedved Sø (Randløv, DOFT, 10. årg., 1915-16)

Faber (1898) skriver: ”Den 9/6 93 hørte jeg, medens jeg om Aftenen sad i Skyttehusets Have ved Vejle, et ejendommeligt Skrig noget borte. Ved at gaa efter Lyden, kom jeg til en stor Samling Tagrør, hvorfra Lyden kom meget stærkt; den kunde nærmest betegnes som: Uit! Uit! og den var meget kraftig og gentoges i lang Tid, uden at det lykkedes mig at faa Fuglen at se. Næste Morgen tidlig gik jeg på Brædder ud mellem Rørene, der stod paa meget fugtig og blød Bund, og det lykkedes mig da at faa den plettede Sumphøne at se paa faa Alens Afstand, idet den ganske rolig gik omkring imellem Rørene uden at ænse min Nærværelse. Den har sikkert ynglet der, da den fandtes hele Sommeren, men da det var umuligt at komme frem overalt i Rørene, fandt jeg ikke Reden. Den 8/9 96 modtog jeg 1 Expl. fra Vingsted Mølle, skude den 7/9. Den skydes af og til i Kjærene ved Uldum og Hesselballe.”

Kristensen (1899): ”Funden død under en Telegraftraad i Eriknavr den 20. August 1890 og skudt ved Løsning den 18. August 1892. Den blev skudt i Hesselballe Kjær den 3. September 1896, og i September 1897 nedlagdes 2 Stykker i samme Kjær. I 1898 skød Provisor Møller 4 plettede Sumphøns ligeledes i Hesselballe Kjær. Den blev skudt ved Ejstrup Sø den 28. September 1898, og først i August s. A. fandtes dens Rede med 6 Æg ved samme Sø.”

Schougaard (1920-24): ”v. Stidsholm Sø, set Maj 1906 der.” – drejer sig antageligt om denne art, selv om den i pågældende artikel er angivet som *Porzana minuta*.

26-27/6 1965 1 Bybæk, Vejle
17/4 1975 1 Rands Fjord
Pr. dec. 1976 1 juv. Skade (fundet død)
31/5 1982 1 syng. Nørrestrand
8/4 1983 1 syng. Dollerup Sø
18/4 1983 1 syng. Stallerup Sø
3/7 1984 1 syng. Nørrestrand
26/5 1986 1 syng. Dons Søndersø
29/4 1987 1 syng. Gudsø Vig
2-23/5 1987 1 syng. Dollerup Sø
10/5 1990 1 syng. Dollerup Sø
8/6 1990 1 syng. Uldum Kær
11/6 1990 1 syng. Nørrestrand
30/10 1991 1 1k Vork, Egtved
8-13/5 1992 1 Høll
14-17/6 1995 1 syng. Nørrestrand
7/6 1997 1 syng. Nørrestrand
9/5 1998 1 syng. Nørrestrand
13/5 1998 1 syng. Nørrestrand
17/8 1998 1 (1k) Dagnæs Bæk
1 – 5/5 1999 1 syng. Nørrestrand
15/8 1999 1 syng. Haraldskær
26/4 2000 3-4 syng. Nørrestrand
27/4 2000 1 syng. Nørrestrand
14/5 2000 1 syng. Viuf
20/7 2002 2 syng. Uldum Kær
20/7 2002 2 syng. Hesselballe Kær
11 + 14/8 2002 1 syng. Galtkær
30/5 2003 3 syng. Klostermølle
6/6 2003 1 syng. Galtkær

Enkeltebekkasin *Lymnocyptes minimus*

Ret almindelig trækgæst, fåtallig vintergæst og meget sjælden sommergæst. Kommer fra Fennoskandinavien og Nordrusland. Forekomsten er tilsyneladende meget afhængig af den ornitologiske aktivitet i fugtige enge og moser, hvor arten ”stampes” op.

Faber (1898) skriver: "Almindelig på Efterårstrækket i fugtige Enge ved Horsens og Vejle. Den 22/12 78 blev 1 Expl. skudt ved Horsens. Den 9/1 92, da Jorden overalt var dækket af Sne, blev 1 Expl. i meget forkommen Tilstand fanget levende i en Gaard i V. Ørum."

1/10 1910 1 Kolding (DOFT, 5. årg., 1910-11, p. 168)
11/10 1910 1 Kolding (DOFT, 5. årg., 1910-11, p. 168)
13/10 1910 1 Kolding (DOFT, 5. årg., 1910-11, p. 168)
28/10 1910 1 Kolding (DOFT, 5. årg., 1910-11, p. 168)

11/8 1923 1 skudt Nørlund Plantage (Wielandt 1924)
 Jan. 1935 enkelte Fårup Sø (Christensen, 1940)
 1/4 1971 1 Håbet, Juelsminde
 26/4 1971 2 Askær
 18/10 1973 1 Donssøerne
 22/10 1973 1 Vejle Fjord
 24/10 1973 - 30/1 1974 5 Kolding Inderfjord

Forekomst af Enkeltbekkasin i Vejle Amt i perioden 1974 – 2003 fremgår af skemaet:

År	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983
Antal	13-15	5	11	7	-	-	2	2	-	6
År	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993
Antal	3	8	12	8	18	45	4	10	5-6	16-19
År	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Antal	22	5	5	4	2	6	7	5	5	5-6

Største forekomster: 7/11 1974 4-5 Kolding Fjord, 2/11 1988 8 Kolding , 26/3 1989 4 Kolding ,
 21/9 1989 11 Nørrestrand, 3/11 1989 6 Kolding, 5/11 1989 4 Vorsø, 14/4 1993 4 Uldum Kær, 24/12
 1993 4 Vejle Inderfjord, 16/1 1994 8 Vejle Inderfjord

Stor Kobbersneppe *Limosa limosa*

Sjælden, fåtallig træk- og sommergæst. Flest iagttagelser fra træktiderne, april/maj og juli/august.

Samtlige data:

31/7 1911 1 (1k) Kolding (Hagerup, DOFT, 6. årg., 1911-12, p. 169)

28/7 1970 25 SV Kolding Inderfjord - fejlbestemmelse ?? p.g.a. det helt ekstreme store antal

31/7 1970 2 Kidholmene

8/8 1973 2 Kolding Inderfjord

23/8 1973 7 Kolding Inderfjord

22/4 1975 2 Rands Fjord

8/5 1979 1 Uldum Kær

20/7 1980 2 Havmarken

Forår 1981 1 han Askær

28/3 1982 1 Hjarnø

27/4 1982 1 Vorsø

8/6 1982 1 Vorsø

17/7 1982 1 Havmarken

22/8 1982 1 Havmarken

13/7 1983 1 Vorsø

14/8 1983 1 Havmarken

8/5 1984 1 Dollerup Sø

7/7 1984 1 Brigsted

22-24/7 1984 1 Gudsø Vig

1/4 1985 1 Uldum Kær

18/4 1985 1 Nørrestrand
22/4 1985 2 Nørrestrand
9/7 1985 1 Vorsø
13/8 1985 1 Brigsted
20/8 1985 1 Brigsted
25/8 1985 1 Brigsted
6/4 1986 1 han Borre Odde
25/4 1986 2 Vorsø
9/6 1988 1 Søvind
3/5 1989 1 Nørrestrand
6/7 1989 1 Brigsted
15/3 1990 1 Uldum Kær
18/3 1990 2 Uldum Kær
19/4 1990 1 Dollerup Sø
19/10 1990 4 Hjarnø
25/4 1991 1 Borre Odde
5/5 1992 1 Borre Odde
9/5 1993 1 Hjarnø
24/7 1993 1 Kolding Inderfjord
25/7 1993 6 Kolding
29/3 1994 2 Høll
23/7 1994 1 Borre Odde
1/5 1995 1 Nørrestrand
2/7 1995 1 Havmarken - Brigsted
30/4 – 2/5 1996 1 Teglværksvej, Løsning
10/5 1997 1 Hjarnø
22/4 1998 1 Uldum Kær
14/7 1998 2 Bollerstien
16/7 1998 1 Hjarnø
16/7 1998 1 Vejle Havn
23/7 1998 2 Borre Odde
19/7 1999 1 Skibelund
20/3 2000 1 Uldum Kær
14/4 2001 1 Uldum Kær
24/7 2002 1 Løver Odde
17/4 2003 1 Galtkær
28/4 2003 1 Tørring Fælled

Sandløber Calidris alba

Ret almindelig trækfugl fra højarktisk Grønland og Rusland. Desuden sjældent sommergæst samt fåtallig vintergæst. Hyppigst langs den jyske vestkyst.

Årlig, men især i de seneste år, fåtallig gæst i Vejle Amt. Alle forekomster er fra efterårstrækket. De tidligste er 12/7 1984 1 S Dons Nørresø, 14/7 1992 4 SV Høll og 15/7 1996 1 Vejle Havn. De seneste er 26/11 1989 1 Borre Odde og 27/12 2000 1 Øvre, Endelave.

7/9 1911 1 Kolding (Hagerup, DOFT, 6. årg., 1911-12, p. 171)
8/9 1911 1 Kolding (Hagerup, DOFT, 6. årg., 1911-12, p. 171)
13/9 1911 3 Kolding (Hagerup, DOFT, 6. årg., 1911-12, p. 171)

Ferdinand (1953) angiver, at der foreligger 5 enkeltfund omkring Kolding i september - desværre uden datoer og årstal, men det må dreje sig om ovenstående fund fra 1911.

22/9 1963 1 Horsens Fjord
24/7 1964 1 Vejle Inderfjord

Der skulle ligeledes være observationer fra 1979 – disse fremgår ikke af lokalrapporten for det pågældende år, men skulle findes i lokalafdelingens arkiv.

År	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991
Antal	12	16	17	4	10	?	12	14+	4	10	38	17
År	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Antal	16	36	6	3	6	1	7	7	4	3	3	2

Forekomst af Sandløber i Vejle Amt, 1980 – 2003.

De største forekomster, 1980 – 2003, er: 3/8 1980 9 Borre Odde, 26/7 1982 7 Ashåb, 13/9 1986 7 Gudsø Vig, 22/8 1990 6 Borre Odde, 29/8 1990 7 Endelave, 2/9 1990 14 Borre Odde, 20/9 1991 9 Bollerstien, 18/7 1993 8 Hjarnø og 27/7 1993 13 Borre Odde.

Almindelig Kjove *Stercorarius parasiticus*

Ret almindelig trækgæst om efteråret fra Østersøen, Vestskandinavien, Nordatlanten og arktiske egne. Fåtalig trækgæst om foråret samt fåtalig sommergæst.

9/10 1890 1 Ejstrup (Collin, 1895)

Larsen (1901): ”

25/8 1973 2 Kolding Fjord
21/5 1974 1 Stenderup Hage
28/4 1977 2 ad. Fårup Sø
5/11 1977 1 Fårup Sø
14/7 1977 1 Bjørnsknude
15/10 1979 1 Juelsminde

År	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991
Antal	1	0	9	5	11	11	4	13	4	15	3	5
År	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Antal	2	9	49	18	3	44	28	4	25	2	2	6

Forekomst af Almindelig Kjove i Vejle Amt, 1980 – 2003.

Største forekomster: 1/9 1984 10 Endelave, 13/9 1987 7 S Bjørnsknude, 27/8 1989 3 V + 5 S Trelde Næs, 4/9 1994 4 R Trelde Næs, 18/9 1994 4 R Bjørnsknude, 18/9 1994 7 V Rosenvold, 18/9 1994 6 R Trelde Næs, 28/9 1994 4 Trelde Næs, 27/9 1995 4 R -> V Rosenvold, 14/9 1997 4+ Bjørnsknude, 16/9 1997 (2 ad. R -> SV, 1 ad. S -> R, 1 1k R) Bjørnsknude, 22/9 1997 4 (1 S + 2 N + 1 R) Bjørnsknude, 30/8 1998 4 SV Bjørnsknude, 2/9 2000 4 Bjørnsknude, 18/9 4 Bjørnsknude, 20/9 2003 4 Ø Rosenvold

Indlandsobs.: 14/8 1982 1 juv. Nørrestrand, 22/9 1982 1 ad. V Dollerup Sø, 10/9 1983 1 1k V Dollerup Sø, 13/10 1985 1 ad. Nørrestrand, 13-15/9 1990 1 rastende på pløjemark Holstdal ved Juelsminde, 1/10 1993 1 V Dollerup Sø, 29/9 2002 1 1k V Dollerup Sø.

Ride *Rissa tridactyla*

Fåtallig yngltrækfugl i Nordjylland. Almindelig træk- og vintergæst samt ret almindelig sommergæst fra Nordatlanten.

Collin (1895): ”D. 16. Okt. 1881 ung Fugl skudt paa Horsens Fjord ... 2. Nov. s. A (1893). gl. Hun i Vinterdragt, Palsgaard ... 5. Januar 1895 blev en Hun fanget med Hænderne af en Brændehugger i Julianelyst Skov pr. Horsens.”

16/1 1898 1 ungfugl skudt Vejle Fjord (Faber, 1898)

4/10 1946 1 Hampen (Poulsen, 1949)

8/11 1946 1 Egtved (Poulsen, 1949)

16/10 1968 4 1k Trelde Næs

1/4 1973 1 ad. død Stenderup, Kolding

De største forekomster af Ride, 1980 – 2003: 30/1 1993 25 ad. + 30 2k Stenderup Hage, 21/2 1993 14 Trelde Næs, 21/10 1995 6 Rosenvold, 5/11 1995 14 Trelde Næs, 31/10 1998 10 (4 ad. + 6 1k) V Rosenvold, 5/12 1999 140 S Bjørnsknude (et meget synligt resultat af orkanen den 3-4/12 1999), 29/10 2000 11 Endelavefærgen, 2/11 2002 18 V Trelde Næs og 8/12 2002 7 1k Ø Rosenvold.

Sommerforekomster, 1980 - 2003: 12/7 1980 2 ad. Havmarken, 30/6 2003 1 ad. Vejle Havn – fuglen havde tilsyneladende opholdt sig på stedet siden 9/6.

Indlandsobservationer, 1980 - 2003: 23/5 1982 1 2k Dollerup Sø og 6/1 1998 1 2k Rørbæk Sø.

År	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991
Antal	2	1	5	14	31	3	1	0	1	4	3	0
År	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Antal	0	72	2	26	11	9	24	141	15	4	34	6

Forekomst af Ride i Vejle Amt, 1980 – 2003.

Dværgterne *Sterna albifrons*

Sjælden, fåtallig gæst, især i juli/august. Tilsyneladende mere hyppig tidligere. Siden 1977 truffet i alle år undtagen 1979, 1990 og 1996.

Faber (1898) skriver: ”Paa Vorsø i Horsens Fjord har jeg ofte fundet dens rede med 2-3 Æg i Juni Maaned. Paa Vejle Fjord ser jeg den regelmæssig sidst paa Sommeren i Smaaflokke.”

Jørgensen (1906): ”Paa Vorsø fandtes i 70-erne en koloni af Dværgterne (*Sterna minuta*), men den har nu været borte i flere Aar.”

25/6 - /8 1910 max. 8 Kolding (Hagerup, DOFT, 5. årg., 1910-11, p. 170)

1/8 1910 5 SV Kolding (Hagerup, DOFT, 5. årg., 1910-11, p. 170)
24/8 1910 3 Kolding (Hagerup, DOFT, 5. årg., 1910-11, p. 170)
18/6 1911 5 Kolding (Hagerup, DOFT, 6. årg., 1911-12, p. 174)
28/6 1911 3 Kolding (Hagerup, DOFT, 6. årg., 1911-12, p. 174)
4/7 1911 6 Kolding (Hagerup, DOFT, 6. årg., 1911-12, p. 174)
8/7 1911 5 Kolding (Hagerup, DOFT, 6. årg., 1911-12, p. 174)
21/7 1911 10 Kolding (Hagerup, DOFT, 6. årg., 1911-12, p. 174)
24/7 1911 1 Kolding (Hagerup, DOFT, 6. årg., 1911-12, p. 174)
27/7 1911 1 VSV Kolding (Hagerup, DOFT, 6. årg., 1911-12, p. 174)

16/7 1918 1 Bryrup Langsø (Schouenborg, 1920-24)
18/5 1935 5 V Fårup Sø (Christensen, 1940)
20/9 1935 1 Fårup Sø (Christensen, 1940)

11/5 1941 1 Dons-søerne (Schjøtz-Pedersen, 1943)
18/5 1941 2 Dons-søerne (Schjøtz-Pedersen, 1943)
8/6 1941 1 Dons-søerne (Schjøtz-Pedersen, 1943)
14/5 1942 2 Dons-søerne (Schjøtz-Pedersen, 1943)

29/7 1963 1 Vejle Inderfjord (Have Jørgensen, 1970)
24/7 1964 1 V Vejle Inderfjord (Have Jørgensen, 1970)
11/8 1964 1 Vejle Inderfjord (Have Jørgensen, 1970)

13/8 1977 1 Rands Fjord
18/8 1978 1 Dollerup Sø
3/7 1980 1 Borre Odde
20/7 1980 1 Havmarken
22/7 1980 4 Trelde Næs
9/7 1981 1 Rands Fjord
27/7 1981 2 Kolding Inderfjord
28/6 1982 2 Hjarnø
26/7 1982 1 Nørrestrand
2/8 1982 1 Spjarup
22/8 1982 1 Stallerup Sø
5/5 1983 1 Vorsø
29/6 1984 1 Dollerup Sø
11/7 1984 2 Nørrestrand
15/9 1984 1 Nørrestrand
8/6 1985 1 Vorsø
26/7 1985 2 Vorsø
13/6 1986 1 Dollerup Sø
18/8 1987 1 Dollerup Sø
3/7 1988 1 Løver Odde, Kolding Fjord
20/7 1988 2 Dagnæs Bæk (Bollerstien)
22/7 1989 1 Bjørnsknude
22/7 1989 2 Vorsø
30/7 1989 2 Vorsø
31/7 1989 1 Gudsø Vig
18/8 1989 1 Høll

26/8 1989 1 Bjørnsknude
 19/7 1991 1 Høll
 3/8 1991 1 trækkende V Dagnæs Bæk
 27/8 1991 1 Vejle Inderfjord
 23/8 1992 4 trækkende V Vejle Søndermark
 17/7 1993 3 Høll
 28/7 1993 1-2 Vejle Havn
 30/7 1993 1 Vejle Havn
 22/7 1994 1 Borre Odde
 6/8 1994 1 Horsens Havn
 12/8 1994 1 Nørrestrand
 20/8 1994 1 Nørrestrand
 18/9 1994 1 trækkende SV Trelde Næs
 18/7 1995 3 ad. Borre Odde
 17/9 1995 3 rastende Rosenvold
 17/7 1997 2 Vejle Havn
 11/9 1997 1 V Rosenvold
 11-12/9 1997 2 1k Vejle Havn
 30/5 1998 1 Lynger, Endelave
 20/6 1998 2 Dollerup Sø
 26/6 1998 1 Dollerup Sø
 11/7 1998 2 trækkende Vejle Havn
 15/7 1998 1 Horsens Havn
 23/7 1999 5 ad. + 1 1k Bygholm Ås udløb i Horsens Fjord
 23/7 1999 2 Rands Fjord
 24/7 1999 2 Bygholm Ås udløb i Horsens Fjord
 15/8 1999 1 ad. Bollerstien
 18/8 1999 1 Nørrestrand
 11/8 2000 1 Bjørnsknude
 24/6 2001 1 Dollerup Sø
 3/7 2001 1 Galtkær
 1/6 2002 1 ad. Nørrestrand
 15/7 2003 1 Nørrestrand
 13/9 2003 1 ad. Vejle Havn

År	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991
Antal	6	3	5	1	4	3	1	1	3	8	0	3
År	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Antal	4	4-5	5	6	0	5	6-7	10	1	2	1	2

Forekomst af Dværgerterne i Vejle Amt, 1980 – 2003.

Tejst *Cepphus grylle*

Fåtallig ynglestrejffugl i Kattegat og Bælthavet. Træk- og vintergæst fra Finland og Østsverige (ssp. grylle) eller Vestsverige og Sydnorge (ssp. atlantis).

Kjærbølling/Collin (1875-77): ”i 1876 ynglede den ifølge Grills Angivelse paa Endelave.”

Faber (1898) skriver: ”Paa Vejle Fjord har jeg skudt den den 4/12 81, 12/1 82, 30/10 88, 15/8 89, 22/10 90 (3 Stk.), 26/11 92 og set den mange Gange foruden de nævnte Data, bl. a. saa tidligt som den 3/8 90.”

10/10 1929 1 Juelsminde (ringmærket 26/6 1929 Hakefjord, Sverige) – af typen Baltisk Tejst *Cephus g. grylle*. (Adelholt, 1958):

Rosendahl & Skovgaard (1968):

20/6 1954 1 3 sømil øst for Ashoved (ringmærket 2/7 1953 Nordre Rønner)

8/11 1958 1 Trelde Næs (ringmærket 27/6 1958 Sejerø)

4/10 1962 1 Vejle Fjord (ringmærket 26/6 1962 Sejerø)

26/10 1964 1 død Lillebælt ud for Vejle Fjord (ringmærket 20/6 1964 Sejerø)

Yngler årligt på Endelave, hvor bestanden nu tilsyneladende er stabil med ca. 15 par (se skema) – endvidere foreligger oplysninger om 3 par i 1975, og 1-2 par i 1978. Desuden ynglede Tejsten på Hjarnø i årene 1968, 1973, 1992 (yngleforsøg, 1-2 par) og 1993 (3 par).

År	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991
Par	5	6	4-6	3-6	7	1-4	1+	?	4	7	5	8-9
År	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Par	14	16-18	15	20	16	17	13	16	16	?	?	?

Ynglebestanden af Tejst på Endelave, 1980 – 2003.

De største forekomster på Endelave (Sydkysten) er: 4/4 1980 15, 9/4 1982 min. 16, 23/5 1983 14-16, 20/5 1984 15 ad., 25/4 1986 16 ad., 27/3 1988 10 ad. + 1 2k, 28/5 1988 14, 18/6 1988 12, 8/4 1990 10, 19/5 1990 12, 22/4 1991 20, 18/5 1991, 5/6 1991 19 ad., 18/7 1991 14 ad., 16/5 1992 28 ad., 19/4 1993 34, 7/6 1993 32, 1/4 1994 35, 16/4 1994 32, 24/7 1994 19, 4/8 1995 40, 13/3 1998 34, 29/7 2000 18, 24/5 2001 12, 18/4 2002 15, 29/3 2003 16.

Samtlige observationer udenfor yngleområdet (klinten på Sydkysten) på Endelave, 1979 – 2003:

31/3 1979 1 Ashoved

23/3 1980 1 Ashoved

7/2 1982 1 Ashoved

26/12 1982 1 død Endelavefærgen

10/2 1983 1 Ashoved

9/8 1983 1 1k Endelave (Lynger Hage)

29/10 1983 1-2 Ashoved

22/5 1984 2 Endelavefærgen

19/8 1986 1 1k Vorsø

1/10 1988 1 ad. Bjørnsknode

27/5 1989 2 ad. Vorsø

8/10 1989 1 ad. trk. N Bjørnsknode

26/4 1991 2 Hjarnø

11/5 1991 1 Hjarnø

28/5 1991 2 ad. + 1 2k Hjarnø - muligvis yngleforsøg på Hjarnø i 1991.

24/3 1991 2 Stenderup Hage

3/5 1992 2 Hjarnø

28/6 1992 3 Hjarnø

23/7 1992 3 ad. Hjarnø

25/7 1992 2 Hjarnø
20/9 1992 1 Trelde Næs
12/4 1993 1 Trelde Næs
9/5 1993 4 Hjarnø
30/5 1993 4 Hjarnø
4/7 1993 4 Hjarnø
18/7 1993 3 Hjarnø
4/9 1993 1 Trelde Næs
13/10 1993 1 Bjørnsknude
27/3 1994 1 Hjarnø
31/3 1994 3 Hjarnø
6/5 1994 3 Hjarnø
Efterår 1994 1 Ashoved
10/9 1994 1 Trelde Næs
9/10 1994 1 Rosenvold
3/4 1995 2 Hjarnø
13/7 1995 1 Endelavefærgen
6/8 1995 1 Rosenvold
18/11 1995 1 Rosenvold
18/9 1997 1 S + 1 S/R Bjørnsknude
20/9 1997 1 N/R Bjørnsknude
20/9 1991 1 S Øvre, Endelave
21/9 1997 1 1k N Bjørnsknude
5/10 1997 1 1k rastende Rosenvold
9/10 1997 1 N Bjørnsknude
12/10 1997 1 S Bjørnsknude
15/3 1998 1 Bjørnsknude
5/9 1998 1 Horsens Fjord ved Stensballe Sund
2/10 1998 2 S Bjørnsknude
24/10 1998 1 Rosenvold
25/10 1998 1 S Bjørnsknude
22/4 1999 2 Endelavefærgen
5/10 1999 1 Rosenvold
17/10 1999 1 Bjørnsknude
29/7 2000 2 Øvre, Endelave
7/1 2002 2 Vejle Fjord ved Staksrode Skov
13/3 2002 1 Vejle Inderfjord
26/9 2003 1 V Rosenvold

Søkonge Alle alle

Tidligere en meget sjælden gæst. I de seneste år en fåtallig - sjælden træk- og vintergæst fra højarktiske områder. Visse år, f. eks. 1996, dog "talrig" efterårs-/vintergæst ved kysterne.

Faber (1898) skriver: "Hos fhv. Seminarielærer Ipsen i Vejle opbevares et udstoppet Expl., der i October eller November 1890 blev fanget levende ved Jellinge."

Lidt sjovt, at amtets ældste Søkonge tilmed var en indlandsobservation, idet der kun foreligger yderligere 2-3 forekomster af arten inde i landet (1985, 2001 samt muligvis 1987).

14/11 1899 1 skudt Kokborg, ½ Mil syd for Ejstrup (Larsen, 1901)

Efteråret 1961 1 oliedræbt Vejle Fjord

28/10 1984 1 Stenderup Hage (Godkendt af SU)

10/11 1984 8 Tirsbæk (Godkendt af SU)

11/11 1984 1 Tirsbæk

17/11 1984 1 Tirsbæk

6/11 1985 1 Dallerup Sø – fundet afkræftet på Dallerupvej - døde senere (NB. Indlandsobs.)

12/11 1985 2 Ashoved

13/11 1985 1 Daugård Strand

Nov. 1985 1 Juelsminde - fanget i sildegarn

26/1 1986 2 Hjarnø Sund

26-28/10 1986 1 Vorsø

9/11 1986 1-2 Trelde Næs

20/2 1987 1 Stenderup Hage

Med. nov. 1987 1 Horsensegnen – døde (NB. Indlandsobs. ???)

4/4 1988 1 Vorsø

2/11 1988 1 Vejle Inderfjord

19/11 1988 1 Endelavefærgen

17/11 1989 1 Bjørnsknode

26/11 1989 1 Bjørnsknode

7/12 1989 1 Trelde Næs

5/2 1990 1 Trelde Næs

13/2 1990 2 Bjørnsknode

25/2 1990 1 Stenderup Hage

13/3 1990 1 Trelde Næs

5/10 1990 1 Bjørnsknode

3/11 1990 1 Bjørnsknode

11/11 1990 1 død Hjarnø

2/12 1990 1 Bjørnsknode

28/12 1990 1 Trelde Næs

20/10 1991 1 Fredericia Havn

16/11 1991 1 Borre Odde

27/12 1992 21 Gl. Lillebæltsbro

Efterår 1994 1 Kirkholm

29/10 1995 1 Hundshage

29/10 1995 1 Juelsminde

29/10 1995 2 Rosenvold

29/10 1995 10 Bjørnsknode

29/10 1995 3 Asvig

4/11 1995 3 Bjørnsknode

4/11 1995 3 Trelde Næs

5/11 1995 1 Bjørnsknode

7/11 1995 3 Rosenvold

8/11 1995 2 Rosenvold

9/11 1995 2 Bjørnsknode

9/11 1995 1 Trelde Næs

11/11 1995 4 Bjørnsknode

12/11 1995 2 Bjørnsknude
12/11 1995 5 Trelde Næs
18/11 1995 2 Trelde Næs
19/11 1995 4 Rosenvold
25/11 1995 1 Rosenvold
25/11 1995 1 Sandbjerg Vig
25/11 1995 1 Asvig
29/2 1996 1 Trelde Næs
1/3 1996 1 Trelde Næs
2/3 1996 1 Trelde Næs
28/10 – 28/12 1996 stor invasion med forekomst af ca. 300 fugle, hvoraf de fleste sås i november.
Største obs.: 8/11 15 Trelde Næs, 9/11 11 Trelde Næs, 10/11 30 Rosenvold og
14/11 11 Bjørnsknude.

1/1 1997 1 Juelsminde
1/1 1997 2 Snaptun
1/1 1997 1 Hagenør
30/1 1997 4 Trelde Næs
9/2 1997 1 Trelde Næs
20/2 1997 1 Trelde Næs
22/2 1997 2 Trelde Næs
28/2 1997 1 Vejle Fjord ved Vejlefjordskolen, Daugård
9/3 1997 1 Ashoved
16/3 1997 1 Bjørnsknude
26/4 1997 1 Holtser Hage
26/10 1997 1 Ø Rosenvold
27/10 1997 2 Trelde Næs
2/11 1997 1 Trelde Næs
7/11 1997 1 Bjørnsknude
8/11 1997 1 V/R Rosenvold
14/11 1997 1 Bjørnsknude
23/11 1997 1 Bjørnsknude
8/12 1997 1 Bjørnsknude
19/12 1997 1 Trelde Næs
26/12 1997 1 Trelde Næs
27-28/12 1997 1 Øvre, Endelave
25/1 1998 2 Bjørnsknude
24/10 1998 5 Rosenvold
14/11 1999 1 NØ Bjørnsknude
15/11 1999 1 NØ Bjørnsknude
21/11 1999 1 N + 1 SV Bjørnsknude
21/11 1999 2 Ashåb
25/11 1999 1 Fredericia Østerstrand
25/11 1999 1 Stenderup Hage
5/12 1999 5 NØ + 1 rastende Bjørnsknude
19/12 1999 2 SV Bjørnsknude
19/12 1999 1 Trelde Næs
19/12 1999 2 Borre Odde
19/12 1999 1 Vejle Havn
20/12 1999 1 Endelavefærgen

29/12 1999 1 Bjørnsknude
 30/12 1999 3 Horsens Havn
 2/1 2000 5 Horsens Havn
 6/1 2000 1 Horsens Havn
 8/1 2000 3 Horsens Havn
 3/2 2000 1 Horsens Havn
 14/2 2000 1 Vejle Havn
 16/10 2000 1 Trelde Næs
 6/3 2001 1 Trelde Næs
 2/11 2001 1 Vorsø
 10/11 2001 1 Trelde Næs
 11/11 2001 1 Juelsminde
 19/11 2001 1 Trelde Næs
 24/11 2001 3 S + 1 rastende Bjørnsknude
 24/11 2001 1 Endelave
 23/12 2001 1 Vær Bæk (NB.: Indlandsobs.)
 6/1 2002 1 V Rosenvold
 10/2 2002 1 V Rosenvold
 28/10 2002 1 N Bjørnsknude
 2/11 2002 1 Borre
 14/12 2002 1 Trelde Næs
 16/12 2002 1 Trelde Næs
 18/1 2003 1 V Rosenvold
 15/2 2003 1 Ø Rosenvold

1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993
11	5	4-5	2	3	3	10	2	21	-
1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
1	52	300	28	7	25	12	11	6	2

Forekomst af Søkonge i Vejle Amt, 1984 – 2003.

Slørugle *Tyto alba*

Kjærbølling/Collin (1875-77) skriver: ”Faber havde (Ornith. Not. Pag. 11) et Exemplar fra Føhr, men han benægter, besynderligt nok, dens Forekomst i det egentlige Danmark. I Horsens- og Kolding-Eggen, der (da Faber boede i Horsens) dog laae hans Forskninger nærmest, er efter Forfatterens Angivelse ikke færre end 5 Exemplarer skudte i Aarene 1846-47.”

Collin (1888): ”Den yngler i adskillige Landsbykirker i Horsens-Eggen. H. Faber fandt saaledes dens Reder i Hansted Kirke d. 27. April 1878 (5 Æg), i Ølsted Kirke (sammen med *Athene noctua*) d. 14. Mai 1878 (3 Æg) og d. 3. Mai 1879 (5 Æg). I Ølsted Kirke fandt han den atter d. 6. Mai 1880 reden med 4 Æg, i 1882 med 6 Æg og i 1883 med 7 Æg, i Hansted Kirke paany i 1882 (4 Æg) og i Væhr Kirke (4 Æg). .. H. Faber modttog d. 7. April 1879 et Par Slørugler, der vare fangne i et Dueslag ved Horsens; det følgende Aar fandtes et Par døde Individder paa Loftet i Ølsted Kirke. D. 8. April 1884 fandtes reden med 5 Æg i Vedslet Kirke og d. 28. April s. A. i Thyrssted Kirke pr. Horsens (6 Æg).”

Collin (1895): "5. Juni 1892 fandt Faber 4 Unger i Hedensted Kirke pr. Vejle og 14. Mai 1893 sammesteds Reden med 3 Æg og 3 Dununger."

Faber (1898) skriver: "I Horsens-egnen yngler Sløruglen i adskillige Landsbykirker. Den 27/4 78 fandt jeg den med 5 Æg i Hansted Kirke, 14/5 78 3 Æg i Ølsted Kirke, 3/5 79 3 Æg sammesteds, 4/5 79 5 Æg i Nebsager Kirke. I Ølsted Kirke havde den i 1880 4 Æg, i 1882 6 Æg og i 1883 7 Æg. Th. Jørgensen fandt den 24/4 93 Reden med 6 Æg i Thyrsted Kirke. I Hedensted Kirke mellem Vejle og Horsens fandt jeg den 5/6 92 Reden med 4 Unger, den 14/5 93 med 2 Æg og 3 Unger.....Mærkeligt nok synes Sløruglen at yngle 2 Gange om Aaret. Th. Jørgensen har den 22/9 93 og den 5/9 95 fundet dens Rede i Thyrsted Kirke, begge Gange med 5 Æg. I April 1879 bragtes mig fra Egebjerg ved Horsens 2 Slørugler, der vare fangede i et Dueslag hvor de havde taget Ophold uden iøvrigt at fortrædige Slagets retmæssige Beboere.... I Horsens-egnen fandt Th. Jørgensen den 5/8 96 Reden med ikke mindre end 9 Æg, hvilket var 2det Kuld, da det vidstes med Bestemthed, at der havde været et tidligere Kuld paa samme Sted."

Georgsen (1902) nævner én forekomst: "15/6 1901 blev en Slørugle funden død i Klokkedal pr. Horsens."

Jespersen (1937) angiver mindst 35 ynglelokaliteter 1880 - 1930.

30/9 1933 1 Åle (fanget i hus – ringmærket 24/5 1933 i Askov) (Skovgaard, 1932-37)

9/1 1940 1 død Bastrup, Vamdrup (ringmærket 16/6 1939 i Frørup) (Skovgaard, 1938-42)

23/1 1040 1 Vonsild (fanget syg og døde – ringmærket 16/6 1939 i Frørup) (Skovgaard, 1938-42)

Rosendahl (1972):

22/6 1936 pull. ringmærket Ferup Skov - fundet død 21/3 1945 Ødis

22/7 1946 pull. ringmærket Bredal - fundet 19/9 1947 Tåstrup Mose

16/11 1961 1 fundet død Solskov, Hedensted - var ringmærket som pull. i Brendstrup 20/6 1961

22/6 1963 1 Randbøl Hede

Efteråret 1967 1 fundet død på Koldingegnen

5/11 1968 1 Sdr. Bjert

21/2 1969 1 fundet død Kolding

25/2 1969 1 fundet død Skanderup

1969: par ynglende Hovborg

12/3 1970 1 død af sult Bølling, Egtved

27/11 1970 1 fundet død Fredericia

1971: par ynglende nær Viuf

1973: 2 par (et i den sydlige del + et mellem Vejle og Juelsminde)

1974: 1 par med unger i den nordlige del af amtet (Vinten ?)

Ult. maj 1974 1 Elbodalen

1975: 4 par + 3 enlige i Vejle amt

5/2 1976 1 død Taps Vestermose

1977: 1 Fovslet

- arten er forsvundet fra de kendte lokaliteter

15/1 1979 1 Kolding

15/5 1979 1 Fovslet

20/4 1980 1 Randbøl Hede

6/12 1981 1 1k Skanderup (havde brækket højre vinge og måtte aflives)
 1982: min. 1 på den gamle yngleplads i St. Hansted Ådal
 Vinteren 1982/83 1 fundet død ved lokaliteten i St. Hansted Ådal
 23/7 1983 1 Uhre Mark
 Ca. 15/1 1985 1 død Skærbæk
 11/6 1987 1 nær Kolding
 1990: Invasion i efteråret - 1 levende i sept. og 1 død i nov.
 1991: 2 ynglepar i amtet - det ene fik 1 unge på vingerne
 Jan. - marts 1991: 3-4 døde.
 1992: et ynglepar samt 1-2 eks. i amtets sydlige del.
 16/5 1993 1 Nørrestrand
 1994: 1 par fik 2 unger på vingerne (Bjerre Herred)
 1995: 1 par fik 3 unger på vingerne (Bjerre Herred)
 17/12 1995 1 Østbirk
 1996: 2 ynglepar med 3 og 4 flyvefærdige unger (Bjerre Herred/"Kolding")
 1997: 1 ynglepar med 3 flyvefærdige unger (Kolding) - desuden fundet gylp på 2 lokaliteter
 1998: Ingen obs. af slørugler i amtet (???)
 1999: 5 obs. - 1 ynglepar i den sydlige del af amtet samt 3 mulige i den nordlige
 2000: 2 eks. i den nordlige del af amtet.
 2001: 4 ynglepar i den sydlige del af amtet.
 2002: Ingen oplysninger.
 2003: Oplysninger om 2 fugle, hvoraf den ene vides med sikkerhed at være ynglefugl på lokaliteten, hvor den er set, og det forlyder, at parret fik 1 unge.

Stor Hornugle *Bubo bubo* (SU-art t.o.m. 1995)

Meget sjælden ynglefugl og strejfgæst. Udryddet som dansk ynglefugl fra 1885 - 1984, hvor arten genindvandrede fra Nordtyskland og ynglede i det sydvestlige Jylland. Første ynglefund af den nye bestand i Vejle Amt blev gjort i 1991.

Kjærbølling/Collin (1875-77) skriver: "For en Del Aar siden er den skudt af Hr. Kammerherre Juel Wind til Stensballegaard ved Horsens; ... ved Rosenvold i Jylland (Godsforvalter Levinsen)."

Herschend (1884) skriver: "Blandt Steder her i Egnen, hvor den store hornugle er bleven skudt, kan nævnes: Skovene omkring Himmelbjerget, Gyllingnæs og Rathlousdal Skove; Proprietær van Deurs skjød for ca. 10 Aar siden en saadan Ugle siddende på Taget af Ny Mølle. Det Exemplar, som jeg har udstoppet i min Samling, er skudt i Marts 1877 i den skovløse Egn ved Eistrup, 5 Mil vest for Horsens."

Faber (1898): "1 Expl. i Lærer K. Kristensens Samling i Hesselballe er skudt midt i Halvfjerserne ved Haurum i Uldum-Egnen." (Fundet nævnes også af Kristensen, 1899).

Ca. 1842 1 skudt Stensballe Skov

30/4 1869 æg taget Vester Palsgård Plantage (Collins, 1877, angiver årstallet til 1860)

Jan. 1865 1 skudt Rosenvold

1 skudt Tirsbæk Skove

1 skudt Rask (Mølle)

Dec. 1866 1 skudt Haraldskær

20/3 1870 2 æg taget Vinding Skov (ved Brædstrup)

1875 1 skudt Haurum vest for Horsens
Efterår 1875 1 skudt Ejstrup (Larsen, 1901)
1877 1 skudt Ejstrup (5 mil v. f. Horsens)

Ca. 24/9 1986 1 2k død Søgård Sø

Ca. 30/1 1989 1 Årupgård/Bygholm Sø (?)

1990 fældefjer fundet "Kolding"

1991 fældefjer fundet Jordrupskovene

1991 ynglepar med 3 juv.

1992 ynglepar med 2 juv.

Efterår 1992 1 Øster Starup (?)

4-5/3 1993 1 syngende han Elbæk Skov, Horsens

1993: ynglepar med 2 juv.

1993 1 Sandmarken, Addit

1993 1 Almind

1993 1 Ammitsbøl Skov

1994: ynglepar med 2 juv.

1994 1 Almind - 1 fundet død Almind Grusgrav

1995: 3 ynglepar med 1, 2 og 3 juv.

24/6 1995 1 syngende han ca. 1 km nordvest for Vilholt Mølle

1996: 3 par med 0, 2 og 3 unger.

1997: 1 par med 2 flyvefærdige unger - desuden 3-5 eks. på 3 lokaliteter.

1998: 2-3 par. Ingen unger. Marts - pr. august 1998 1 Remmerslund Grusgrav

1999: 17/5 1 trafikdræbt ved Hejse Kro. Min. 3-4 par, heraf ét med 1 flyvefærdig unge.

2000: 4-5 par, hvoraf ét fik 3 unger. Endvidere mindst 3 enlige fugle, hvoraf en våd og forkommen blev fundet på Horsens Havn 22/6.

2001: 6 par, hvoraf 3 fik i alt 7 flyvefærdige unger. 1 trafikdræbt fugl blev fundet om foråret i den nordlige del af amtet.

2002: 5 par – hvoraf 2 par fik henholdsvis 1 og 2 unger. På yderligere 2 lokaliteter blev der konstateret tegn på tilstedeværelse af arten.

2003: 5 par med i alt 9 unger. Desuden tilstedeværelse på 3 lokaliteter.

Kirkeugle *Athene noctua*

Tidligere ret almindelig ynglefugl. Fra midten af 1980'erne markant tilbagegang i bestanden i hele landet. I Vejle Amt yngler arten sandsynligvis ikke mere.

Kjærbølling/Collin (1875-77): "Ved Kirker i Jylland fandt Forf. Den hyppigt ynglende f. Ex. ved Engom, Hedensted, Hveissel, Ringgive Kirker pr. Veile."

Faber (1898) skriver: "I Horsens-egnen har jeg fundet den ynglende i Gangsted Kirke og Ølsted Kirke (14/5 78 - 4 Æg), i Væhr Kirke (6/5 79 - 1 Æg og 3/5 82 - 4 Æg). I Vejle-egnen i Vinding, Pjedsted og Hover Kirker og ved Vellinggaard i et hult Træ. Th. Jørgensen fandt den 11/5 96 Reden med 5 Æg i et hult Træ paa Chausseen syd for Horsens."

Georgsen (1901): "Et enkelt Æg fundet i Thyrssted Kirke i 1899. Fuglen set samme Sted den 23. Marts 1900."

Georgsen (1902): ”Yngler stadig og har i mange Aar ynglet i en gammel Eg ved Kjærshuset, Horsens.”

Jespersen (1937) angiver, at kirkeuglen yngede på mindst 30 lokaliteter omkring år 1900.

2/9 1939 1 fundet død i kakkelovn Høllund Overgaard (ringmærket 15/6 1935 Skrydstrup Kirke) (Skovgaard, 1938-42)

15/2 1940 1 ad. ringmærket Landerupgård – fundet død sammesteds 4/11 1940 (Danske Fugle, bind 5, 1942)

Rosendahl (1972):

26/6 1952 pull. ringmærket Tørring - gemeldt 17/2 1956 Grædstrup

Til og med 1960 par ynglende i hult træ Fovslet

1961: par ynglende Solskov, Hedensted

1960'erne par ynglende Sdr. Bjert (på kirkegården)

7/4 1963 2 (par ?) Smidstrup

1966-69 par ynglende i redekasse i gran Høgdal Skov, Daugård

1971: par ynglende i stor stærekasse Øster Starup

1972: par ynglende Molgjer

1973: 1 juv. Skyttehusbugten, Vejle

1 par Skibet

Med. juni 1973 2 Assendrup

1974: Nye lokaliteter er St. Hansted Ådal, Kongsø Plantage og Nr. Snede

15/7 1975 1 Vinten

1975: Nye lokaliteter er Viuf, Ulkind og Voerslunde

April 1976 1 Vinten

1976: 1 Skade

1 par Grejsdalen

1977: 1 par Ødis

5/7 1977 1 Dalby

26/8 1977 1 Hejse Kro

30/10 1977 1 Fovslet

1978: 1 par Jerlev

1 par Haraldskær

1/6 1979 1 Jelling

20/3 1980 1 Ødis

4 - 12/7 1981 1 Vamdrup

1981: 1 par med 1 juv. Palsgård Slotspark, Juelsminde

1 par (?) Rands Fjord

1982: 1 Egeskov Kirke - stationær

31/1 1982 1 Hosby

Feb. - april 1982 hørt jævnlige Palsgård Slotspark

6/5 1982 1 Palsgård Slotspark

28/11 1982 1 Hosby

1/12 1982 1 Brigsted

1982: 1 par ynglende Vamdrup

22/4 1983 1-2 Nøttrup

10/7 1983 2 Hylkedal
1983: 1 Egeskov Kirke - stationær
1983: 1 par med juv. Ulkind
 1 par med 1 juv. Tyrsted (Anemonevej)
 1 par med 2 juv. Torup, Hedensted
 1 par Vrigsted
30/4 1984 1 Gelballe
25/9 1984 1 juv. Sjølund
1984: 1 par med 3 juv. Ulkind - desværre druknede den ene unge i en havevandkande.
20/4 1985 1 Ødis
27/9 1985 1 Tørring
1985: 1 par med min. 2 pull. Anemonevej, Tyrsted
 1 par med min. 1 pull. Sdr. Aldum
7/5 1986 1 Vamdrup
9/5 1986 1 Vamdrup
Dec. 1986 gylp fundet Harteværket, Kolding
1986: 1 par Tyrsted - frem til 8/6, hvor hunnen fløj imod en mur og blev dræbt. Hannen forsvandt kort tid efter.
9/4 1987 1 Vamdrup
8/4 1989 1 han + 1 hun hørt Dalagervej, Horsens
9/5 1989 1-2 Kolding Å
21/12 1994 1 Ølholm Kær
1996: 7 eks. (heraf døde 2 i vinteren 1995/96) på 4 lokaliteter.
1997: 1 obs. af 1 eks.
1998: 3 eks. på 3 lokaliteter. (heraf 10/5 1 overflyvende og kaldende Nørrestrand)
1999: Ingen ynglefund. 2-3 eks.
2000: 2 obs. af 1 eks.
2001: 1 obs. af 1 eks.(9/4)
2002: Ingen oplysninger
2003: 2 eks. på 2 lokaliteter.

Mosehornugle *Asio flammeus*

Kjærbølling (1852): "Den yngler enkelte Steder her i landet, f. Ex. i Engom Mose pr. Veile..."

Faber (1898) skriver: "Selv har jeg aldrig set denne Ugle her i Egnen. Min Collega cand. pharm. E. Petersen traf den i Aug. 78 i en Eng ved Bygholm. Lærer K. Kristensen, Hesselballe, angiver den som almindelig i de store Kjærstrækninger i Uldum-Egnen."

Kristensen (1899): "...træffes hele Aaret igjennem i Kjæret mellem Uldum og Tørring, saa den maa yngle der."

Wielandt (1924): "YÅ, 1 sk. I Brunbjergbakker 16:IX:1921." (YÅ = ynglende årligt)

Jespersen (1937): "Formodentlig ynglende ved Fovslet Skov."

16/1 1975 1 Hatting
25/1 1975 2 Rands Fjord

22/9 1976 1 Skærsø
27/11 1976 1 Binderup
18/3 1977 1 Nørrestrand
9/4 1978 1 Ashåb
11/1 1979 1 Dollerup Sø
Dec. 1980 - jan. 1981 2 Svanemosen
26/12 1980 - jan. 1981 1 Borre Odde
17/4 1982 1 Nørrestrand
14-31/12 1982 1 Ødis
11/1 1983 2 Ødis
15/1 - 20/3 1983 1 Ødis
24/1 1983 1 Donssøerne
30/1 1983 1 Dollerup Sø
29/3 - 8/4 1983 1 Vorsø
12/10 - 14/11 1983 1 Ødis
26/2 - 3/4 1984 1 Ødis
9/11 1984 1 Vorsø
10/4 1985 1 Hornborg
17/4 1985 1 Tiufkær Mark
6/1 1986 1 Vorsø
29/3 1986 2 Uldum Kær
20/4 1986 1 Tykskov Hede
25/4 1986 1 Endelave
28/4 1986 1 Nagbøl Søndermose
9/12 1986 1 Ødis
3/3 1987 1 Vorsø
22/10 1987 1 Endelave
16/10 1988 1 Ødis
23/11 1988 1 Ødis
14/1 1989 1 Nørrestrand
30/9 1989 1 Bjørnsknude
21/12 1989 1 Hjarnø
26/3 1990 1 Borre Odde
14/3 1991 1 Uldum Kær
25/3 1991 1 Hedensted
8/12 1991 1 Klosterenge
20/2 1992 1 Bygholm Ås udløb i Horsens Fjord
11/10 1992 1 Stenderup
22/4 1994 1 Nørrestrand
20/10 1995 1 Bjørnsknude
19/11 1995 1 Trelde Næs
29/3 1996 1 Tyrsted
6/4 1996 1 Nørrestrand
16/6 1996 1 Endelave
20/10 1996 1 Rosenvold
5/3 1997 1 Uldum Kær
19/4 1997 1 Øvre, Endelave
1/5 1997 1 Øvre, Endelave
23/9 1998 1 Rosenvold

15/3 1999 1 Vorsø
12/4 2000 2 Uldum Kær
15/4 2000 1 Uldum Kær
10/1 2001 1 Uldum Kær
28/5 2001 1 Nørrestrand
6/10 2001 1 Bjørnsknude
28–31/3 2002 2 Uldum Kær
6/10 2002 1 SV Rosenvold

Natrvn *Caprimulgus europaeus*

Fåtallig yngltrækfugl samt fåtallig trækgæst fra Sydsandinavien. Bestanden i dag er tilsyneladende stabil.

Faber (1898): ”Ikke meget hyppig med vides dog flere Gange skudt baade ved Horsens og Vejle.”

Kristensen (1899): ”forekommer om end ikke almindelig, saa dog ingenlunde sjælden i Uldum-Eggen. Den er blandt andet skudt i Efteraaret 1891 af Hans Holbæk, Hovgaard, den 1. November 1895 af Lærer Hansen, Langskov, o.s.v.”

Larsen (1901): ”Er stærkt i Aftagende ved Ejstrup. For flere Aar siden kunde man om Aftenen i Maj og Juni høre dens snurrende Parringskrig overalt, hvor man gik; nu er den kun ret alm. paa Heden.”

Wielandt (1924): ”YÅ, meget hyppig i skovene.” (YÅ = ynglende årligt)

Torp Pedersen, E. (1963): Frederikshåb Plantage 15. juni 1962. ”Man både så og hørte Natrvn på nært hold.”

Yngler årligt på to lokaliteter i Vejle Amt:

Frederikshåb Plantage: Som regel 3-4 syngende hanner årligt.

- 1976: 5-7 hanner
- 1993: 6 hanner
- 1995: max. 4 hanner
- 1999: 2-4 hanner
- 2000: 2 hanner
- 2001: 3 hanner
- 2003: 4 hanner.

28/7 2003 4 Frederikshåb Plantage

Nørlund Plantage: Pæn bestand - mindst 10-15 syngende hanner (par ?) i hele plantagen, hvoraf en del (de fleste) findes i den del, som hører til Ringkøbing Amt.

- 1992: 7-9 hanner i Vejle-delen samt 7 hanner i Ringkøbing-delen.
- 1993: Bestanden blev opgjort til 10 par.
- 1998: 6 hanner
- 1999: 7 hanner
- 2001: 5-8 hanner
- 2002: 7 hanner

22/6 2002 7 syngende hanner

- 20/7 2002 10 (7 syngende hanner + 3 hunner)
- 2003: 5 hanner
 - 30/5 2003 4 syngende hanner
 - 14/6 2003 5 syngende hanner

Meget sjælden gæst, jf. nedenstående data, udenfor disse 2 lokaliteter.

1976 1 Møllerup (i yngletiden)
 11/6 1979 1 Svanemosen
 14/5 1981 1 han Endelave
 12/6 1990 1 Fovslet
 23/8 1990 1 Sdr. Vilstrup Skov
 1/10 + 10/10 1990 1 Blåkær Skov
 23/6 1991 1 syngende han Liegård Plantage
 6/7 1991 1 Ferup Skov
 11/6 1993 1 Harrild Hede
 15/6 1993 1 Harrild Hede - 2 par på Harrild Hede i 1993
 19/6 1993 1 syngende han Randbøl Hede
 21/5 1996 1 Kloben Endelave
 12/6 1997 1 syngende Sletkær Grusgrav
 1998: 2 syngende hanner Rørbæk Sø
 22-23/5 2001 1 Rands Fjord (?)
 14/6 2003 1 syng. mellem Boest og Nr. Snede

Vendehals Jynx torquilla

Fåtallig yngltrækfugl samt ret almindelig (?) trækgæst fra Fennoskandinavien.

Arten forekommer årligt i Vejle Amt. Enkelte år er arten med sikkerhed konstateret ynglende (1975, 1981, 1986, 1992 og 1993). Antallet af fugle varierer meget fra år til år – flest ses i år, hvor der konstateres ynglende fugle.

Faber (1898): ”Da jeg ofte har set Vendehalsen baade enkelt og parvis i Skovene ved Vejle i April - Maj og hørt dens ejendommelige Skrig, maa jeg formode, at den yngler der, men Reden har jeg ikke været saa heldig at finde.”

Larsen (1901): ”I Efteraaret 1872 skød jeg et Exemplar i Aale.” Larsen (1901): ”Sjælden her paa Egnen. Skudt ved Fruegaard i Ejstrup Sogn i Maj 1888 (Saaby); jeg selv har skudt den paa min Mark, hvor den sad paa et oprejst Riveskaft d. 10. Maj 1890, og i min Have den 6. Maj 1891.”

Schougaard (1920-24): ”ses ofte paa Foraarsstræk og enkelt Gang i Velling Skov om Sommeren. ♀ sk. 3.: V : 1917.”

Wielandt (1924): ”ÅY, ses hver Sommer i Palsgaard Skov **)”

ÅY = træffes hvert Aar, men yngler maaske ikke hvert Aar i Egnen

**.) Trækket gaar jo tidligt.

År	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983
Antal	4	8+	15+	5+	1	1	2	3	5+	8	6
År	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994
Antal	6	7-8	7+	10	8	7	4	3	22+	13+	2
År	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003		
Antal	1	1	5	3	1	4	4	5	1		

Forekomst af Vende-hals i Vejle Amt, 1973 – 2003.

Toplærke *Galerida cristata*

Toplærken har vist aldrig været særlig talrig, men oplysningerne om dens forekomst i amtet har altid været mangelfulde. Der blev således aldrig foretaget en grundig optælling af bestanden. Det synes dog klart, at dens udbredelse var begrænset til de større byers havne- og industrikvarterer. Nu er arten forsvundet.

I midten af 1970'erne talte bestanden antageligt 40-50 par, men allerede i begyndelsen af 1980'erne begyndte det at gå tilbage, og i første halvdel af 1990'erne var der antageligt kun få par tilbage. Det sidste kendte ynglepar sås i Horsens i 1994-95, men der er iagttagelser helt frem til 1999, hvor der jævnligt (8/3 – 24/5) sås 1 fugl i området omkring havnen.

Kjærbølling/Collin (1875-77) nævner: ”Ved Fredericia yngler den i ikke ringe Mængde.”

Collin (1895) skriver: ”28. Juni 1891 fandt Faber dens Rede med flyvefærdige Unger ved Løsning Station i Jylland.”

Faber (1898) skriver: ”Toplærken er i de senere Aar tiltaget meget i Antal og Udbredelse i Egnen. Om Vinteren træffes den almindelig paa Gader og veje overalt og gjør sig bemærket ved sin pibende Stemme. Tidligere var det sjældnere at træffe den i Yngletiden, men nu findes den mange Steder paa Markerne, og skøndt jeg endnu ikke har opnaaet at finde dens Rede med Æg, har jeg dog hyppigt truffet den med nylig udføjne Unger og kan sige, at den yngler om ikke i stort Antal saa dog ret almindelig i Egnen omkring Horsens og Vejle.”

Bjerglærke *Eremophila alpestris*

Kjærbølling/Collin (1875-77): ”Fra Ringgive ved Veile (Februar 1865) ... findes Exemplarer i zoologisk Museum.”

Collin (1877): ”Sergeant Bruun skød den ved Fredericia d. 10de December 1862 og d. 27de Februar 1870.”

Collin (1895): ”Almindelig i Eistrup-Egnen fra midt i Sept. Indtil April. I Januar 1893 forekom den der i usædvanlig store Sværme, der vare stærkt medtagen af det haarde Vejrlig og af Mangel paa Næring.”

Faber (1898): ”I December 1878 traf jeg den flere gange ved Horsens. Herschend angiver, at 1 Expl. Blev skudt den 25/1 79 paa Gliebinggaards Mark af Propr. Søltoft hos Conservator Sørensen i Horsens saa jeg et Expl. Skudt ved Ejstrup pr. Horsens.”

Vinteren 1892 1 skudt (af flok på 7-8) Tørring (Kristensen, 1899)

25/10 1969 el. 1970 1 Flakken, Kolding

13/12 1974 7 Juelsminde

19/1 1975 16 Endelave

27/11 1979 1 Fårup Sø

Feb./marts 1981 2 Klejs

28/2 1982 1 Bygholm Sø

14/11 1982 1 Havmarken

6/10 1985 1 Hjarnø

12/10 1986 1 Havmarken

8/2 1987 4 Horsens

23/12 1989 3 Vorsø

3/2 1990 1 Bjørnsknode

30/9 1990 7 Bjørnsknode

11/11 1990 2 Borre Odde

15/12 1990 1 Borre Odde

16/3 1991 1 Borre Odde

25/10 1993 1 Rosenvold

1/11 1993 4 Nørrestrand

21/3 1994 4 Havmarken

21/10 1995 1 Rosenvold

28/10 1995 1 Hjarnø

20/10 1996 1 SV Rosenvold

3/10 1998 1 Borre Odde

18/10 1998 1 Bjørnsknode

7/10 2000 1 Rosenvold

14/10 2000 1 Vorsø

15/10 2000 1 Rosenvold

27/12 2000 1 Øvre, Endelave

Nøddekrige *Nucifraga caryocatactes*

Sjælden - ret. almindelig træk- og vintergæst i forbindelse med invasioner fra Fennoskandinavien, Rusland og Sibirien. Meget sjælden ynglefugl.

Findes i 2 racer **Tyknæbbet Nøddekrige** *Nucifraga caryocatactes caryocatactes*, som kommer fra Fennoskandinavien og Rusland, og **Tyndnæbbet Nøddekrige** *Nucifraga caryocatactes macrorhynchos*, som kommer fra det nordlige Sibirien.

Fra 1800-tallet kendes i alt 11 store invasioner (Jespersen, DOFT, 7. årg., 1912-13) men fra disse foreligger ingen konkrete data bortset fra:

Kjærbølling/Collin (1875-77): "I Marts 1844 fik Forf. den i Haven ved Snoghøi; ... Proprietær Lange paa Østedgaard ved Fredericia har oftere fanget den i Kramsfugledøner."

Kristensen, (1899): "... blev skudt i Follerup Skov ved Fredericia sidst i Oktober 1887 af Uhrmager Frandsen i Follerup."

Larsen (1901): "Denne Fugl modtog jeg fra Palsgaard den 12. Septbr. 1888 (Wøldike) og fra Ejstrup Storgaard 18. Oktbr. 1893 (Faber)."

Store invasioner indenfor de seneste ca. 100 år (antal individer i Vejle Amt i parentes) forekom i 1911 (57), 1913 (80+), 1968-69 (133+), 1985-86 (160+), 1988-89 (20) og 1995-96 (83+) mens mindre invasioner fandt sted i 1976 (13), 1982 (7), 1990 (11), 1994 (12), 1997 (13) og 2000 (4).

Efterår 1900 3 skudt Ølsted, Horsens (invasionsår)
Oktober/november 1900 overalt Ejstrup (Larsen, 1901)

Stor invasion i efteråret 1911 (datoer gælder primært indlevering til konservator):

18/9 - 11/11 1911 30 Fredericia (indlev. til konservator)
Ca. 1/10 1911 1 Vejlefjord Sanatorium, Stouby
8/10 1911 1 Stenderup (indlev. til konservator)
11/10 1911 1 Bisholt (indlev. til konservator)
15/10 1911 1 Vinten Skov (indlev. til konservator)
18/10 1911 1 Underup (indlev. til konservator)
19/10 1911 1 Vejleegnen (indlev. til konservator)
23/10 1911 1 Bryrup (indlev. til konservator)
25/10 1911 1 skudt Trelde Skov (indlev. til konservator)
26/10 1911 1 Grimstrup (indlev. til konservator)
Okt. 1911 1 Lunderskov (indlev. til konservator)
Ca. 1/11 1911 1 Skibelund Krat
Efterår 1911 1 Viuf (indlev. til konservator Windeballe, Fredericia)
11 Koldingegnen (indlev. til konservator Windeballe, Fredericia)
Udateret 1911 2 Vejleegnen
1 Jelling
1 Børkop

Stor invasion i efteråret 1913 (datoer drejer sig primært om indlevering til konservator):

28/9 1913 1 Gjelballe, Lunderskov (til konservator H. P. Hansen, Herning)
29/9 1913 1 Herslev (til kons. Windeballe)
29/9 - 8/11 1913 14 Kolding (til konservator C. Windeballe, Fredericia)
30/9 1913 1 Brædstrup (til kons. Windeballe)
30/9 1913 1 Palsgård, Nr. Snede (til konservator H. P. Hansen)
Ult. sept. – med. nov. iagttaget fåtalligt Palsgård Statsskovdistrikt
Ca. 1/10 1913 2 Riis v. Jelling (indlev. til kons. H. P. Hansen)
1 - 22/10 1913 14 Vejleegnen (indlev. til udstopning, C. Windeballe)
2/10 1913 1 Brurup (til konservator H. P. Hansen)
27/10 1913 1 Hastrup Plantage
3/10 1913 1 Frisbæk, Nr. Snede (til konservator H. P. Hansen)
4/10 1913 1 Givskudlund, Jelling (indlev. til kons. H. P. Hansen)
5/10 1913 1 Vejlefjord Sanatorium, Stouby
6/10 1913 1 Fredericia (til kons. Windeballe)
7/10 1913 1 Børkop (til kons. Windeballe)
8/10 1913 1 Aakjærdsdal, Lunderskov (til konservator H. P. Hansen, Herning)
10/10 1913 1 Børkop (til kons. Windeballe)
11/10 1913 1 Børkop (til kons. Windeballe)
13/10 1913 1 Børkop (til kons. Windeballe)
17/10 1913 1 Børkop (til kons. H. P. Hansen)
Ca. 19/10 1913 1 Vejlefjord Sanatorium, Stouby
20/10 1913 1 Trelde (til kons. Windeballe)

21/10 1913 1 Gravens (til konservator Windeballe)
22/10 1913 1 Herslev (til kons. Windeballe)
25/10 1913 1 Fredericia (til kons. Windeballe)
27/10 1913 1 Give (til kons. H. P. Hansen)
27/10 1913 1 Nr. Snede (til konservator H. P. Hansen)
5/11 1913 1 Fredericia (til kons. Windeballe)
6/11 1913 1 Vrigsted (til kons.H. P. Hansen)
9/11 1913 1 Herslev (til kons. Windeballe)
26/11 1913 1 Gravens (til kons. H. P. Hansen)
efterår 1913 adskillige iagtt. Boller
udat. 1913 5 Fredericia (til kons. Windeballe)
okt. - pr. nov 1913 18-20 (indlev. til udstopning hos bundtmager i Vejle)
16/8 1968 3 Vognkær Enge
20/8 1968 1 Skibet
29/8 1968 1 Barrit Skov
4/9 1968 5 ca. 4 km øst for Filskov
9/9 1968 20 Randbøl Plantage
14/9 1968 4-6 Klostermølle
15/9 1968 1 Staushede
16/9 1968 1 Kollerup, Jelling
17/9 1968 3 Gesten
18/9 1968 1 Almind
23/9 1968 1 Vongelund pr. Almind
23/9 1968 1 Vonge
27/9 1968 1 Vandel
28/9 1968 4 Gesten
29/9 1968 2 Randbøldal
1/10 1968 1 Lunderskov
1/10 1968 2 Bølling ved Egtved
1/10 1968 1 Vonge
3/10 1968 1 Ødsted, Vejle
3/10 1968 1 Bredballe, Vejle
4/10 1968 1 Vester Nebel
4/10 1968 1 Korning
5/10 1968 1 Højen Skov
6/10 1968 1 Øster Starup
6/10 1968 1 Lunderskov
8/10 1968 1 Ejstrupholm
9/10 1968 1 Grejsdalen
13/10 1968 1 Kolding
14/10 1968 1 Sellerup
15-31/10 1968 1 Fovslet
17/10 1968 1 Lunderskov
20/10 1968 1 St. Andst
21/10 1968 1 Hjarup
22/10 1968 1 Rårup
26/10 1968 1 Fredericia
26/10 1968 3 Hannerup
26/10 1968 1 Gammel Sole

28/10 1968 5 Sanddal, Fredericia
30/10 1968 1 Bredballe, Vejle
Okt. 1968 6 Horsens (østlige bydel)
1/11 1968 1 Vejstrup, Sjølund
1/11 1968 2 Fovslet
6/11 1968 1 Vejle
8/11 1968 1 Vejle
1-30/11 1968 1 Grejsdalen
9 - 25/11 1968 2 Bredballe, Vejle
13/11 1968 1 Hammer Mølle, Tørring
15/11 1968 1 Daugård Strand
16/11 1968 1 Håstrup, Fredericia
17/11 1968 1 Fovslet
18/11 1968 1 Vejle
25/11 1968 2 Fovslet
27/11 1968 1 Fovslet
8/12 1968 1 Fovslet
Efterår - ca. 20/12 1968 1 Horsens (Sundvejen)
20/12 1968 1 Klostermølle
20/12 1968 1 Kollemorten
22/12 1968 1 Horsens (Bygholm Parkvej)
24/12 1968 1 Øster Starup
Vinteren 1968/69 2 Ødis (iagttaget hele vinteren - pillede strå ud af stråtaget)
6/1 1969 1 Skanderup
Jan. 1969 3-4 Horsens
Jan. - feb. 1969 1 Bredballe, Vejle
3/2 1969 1 Bredballe
22/3 1969 1 Bredballe
Forår 1969 2 Ødis
Pr. april 1969 1 Bredballe
Med. april 1969 1 Bredballe
Sommer 1969 2 Bredballe
2/8 1969 1 par med 6 juv. Bredballe, Vejle - **YNGLEFUND**
17/8 1969 2 Fovslet
14/2 1971 2 Hylkedalen
2/5 1976 1 Randbøldal
Juli 1976 1 Kolding
8/9 1976 1 Gelballe
28/9 1976 1 Stallerup Sø
29/9 1976 1 Voerladegård
30/9 1976 1 Voerladegård
30/9 1976 1 Egholt
30/9 1976 1 Grene
Sept. 1976 4 Skibelund Krat
20/12 1976 - 17/1 1977 1-2 Åkær Å
15/10 - 31/12 1977 1 Nr. Snede
Okt. 1980 1 Løsning
10/1 1982 1 Boller Nederskov
14/2 1982 1 Klokkedal, Horsens

20/2 1982 1 Dollerup Sø
7/3 1982 1 Dollerup Sø
27/5 1982 1 Klokkedal, Horsens
11/10 1982 1 Boller Nederskov
23/10 1982 1 Kolding
18/9 1985 2 Tiufkær
22/9 1985 2 Rørbæk Sø
- Invasion i 1985: Ialt 78 eks. i perioden 18/9 - 31/12. Max.: 15/11 36 eks. Grene Sande. -
- Invasionen fortsatte i 1986: Ialt ca. 81 eks. i perioden jan. - nov.
18/2 1986 4 Kolding
19/4 1986 2 Grejsdalen
4/6 1986 1 par med 3 juv. Vibevej, Horsens - **YNGLEFUND**
6/7 1986 2 Vamdrup
7/7 1986 3 Bramdrupdam
30/7 1986 2-3 Klejs Skov
16/8 1986 2 Vamdrup
23/8 1986 2 Nørrestrand
24/5 1987 1 Brude Sø
11/6 1987 1 Egtved
13/6 1987 1 Brude Sø
11/9 1988 1 Horsens Idrætspark
14/9 1988 1 Vorsø
29/9 1988 1 Egtved
2/10 1988 1 Egtved
13/10 1988 1 Egtved
21/10 1988 1 Egtved
23/10 1988 1 Dollerup Sø
30/10 1988 1 Dollerup Sø
30/10 1988 1 Ferup
Ca. 30/10 1988 1 Brejning
2/11 1988 1 Bølling, Egtved
21/11 1988 1 Egtved
31/12 1988 2 Egtved
7/1 1989 1 Egtved
8/1 1989 1 Uhrhøj, Vejle
21/3 1989 1 Egtved
23/4 1989 1 Slauggård, Randbøl Hede - fældefjer fundet
Maj/juni 1989 1 Rådvad, Kolding - fældefjer fundet
23/7 1989 1 Gelballe Skov - fældefjer fundet
21/1 1990 1 Nørhoved
21/10 1990 1 Nr. Snede
Ult. marts 1991 1 Sdr. Bjert
26/10 1991 1 Væng Sø
29/3 1992 1 Fredericia
18/10 1992 1 Rørbæk Sø
22/10 1992 1 Rosenvold
2/12 1992 1 Egtved
Ca. 15/9 1994 1 Galtkær
19/9 1994 1 Rosenvold

24/9 1994 1 Borre Odde
9/10 1994 1 Juelsminde
9/10 1994 1 Rosenvold
12/10 1994 1 Rosenvold
15/10 1994 1 Horsens
15/10 1994 1 Rosenvold
17/10 1994 1 Rosenvold
19/10 1994 1 Horsens
28/10 1994 1 Rosenvold
30/10 1994 1 Horsens
30/9 1995 1 trækkende V Rosenvold (N. c. macrorhynchus)
7/10 1995 1 SV + 1 rast Vejlefjordskolen, Daugård
8/10 1995 1 Rosenvold
8/10 1995 1 S Dollerup Sø
9/10 1995 2 Vejle Sønderskov
 /10 1995 1 Fredericia
11/10 1995 1 trækkende V Rosenvold
13/10 1995 1 Stenderup
15/10 1995 1 Uhrhøj
15/10 1995 1 Rævebjerg
16/10 1995 1 Assendrup
16/10 1995 1 Trelde Skov
21/10 1995 2 trækkende + 1 R Rosenvold (én trk. bestemt til N. c. macrorhynchus)
22/10 1995 1 Børkop
23/10 1995 1 Juelsminde
24/10 1995 1 Kolding
27/10 1995 1 Jelling Skov
28/10 1995 1 trækkende SV Rosenvold (N. c. caryocatactes)
29/10 1995 1 trækkende V Rosenvold (N. c. macrorhynchus)
29/10 1995 1 Nebbegård Skov
29/10 1995 1 Horsens
30/10 1995 1 Horsens
Okt. 1995 2 Fovslet
Okt. 1995 3-4 Fovslet Skov
Ca. 1/11 1995 1 Bredballe
4/11 1995 1 Vejle Søndermark
4/11 1995 1 As Ore, Juelsminde
5/11 1995 1 Vejle Søndermark
7/11 1995 1 Fredericia
9/11 1995 1 Fredericia
3 - 12/11 1995 1 Snaptun
11/11 1995 1 Juelsminde
17/11 1995 1 Fredericia
17/11 1995 1 Bredballe
18/11 1995 2 S Høll (N. c. macrorhynchus)
18/11 1995 1 Bredballe
Nov. 1995 1 Grejsdalen
1/12 1995 2 Fredericia
15/12 1995 2 Fredericia

17/12 1995 1 Juelsminde
20/12 1995 1 Børkop (N. c. macrorhynchus)
23/12 1995 1 Bredballe
24/12 1995 1 Vejle Søndermark
26/12 1995 1 Petersholmskoven, Vejle
Dec. 1995 1 Tyrrestrup
Dec. 1995 1 Glud
Med. dec. 1995 1 Fredericia
Jan. 1996 1 Kolding
10/1 1996 1 Vejle
27/1 1996 1 Vinding
28/1 1996 1 Trelde Næs
4/2 1996 1 Vedbæksvænget, Horsens (N. c. macrorhynchus)
6/2 1996 1 Firkløvervej, Horsens
13/2 1996 1 Vedbæksvænget, Horsens
16/2 1996 2 Børkop
1/3 1996 1 Sdr. Kirkegård, Kolding
2/3 1996 1 Holtser Hage (N. c. macrorhynchus)
13/3 1996 1 Hørmøllen, Vejle
3/4 1996 2 Bredballe
1/5 1996 2 Bredballe
Pr. maj 1996 1 Bredballe
6/5 1996 1 Dagnæs, Horsens
13/5 1996 1 Vedbæksvænget, Horsens
22/5 1996 1 Bramdrup Skov (frisk tabt brystfjer)
28/5 1996 1 Marielund, Kolding
18/6 1996 2 Børkop
26/6 1996 4 (par med 2 juv.) Vedbæksvænget, Horsens - **YNGLEFUND**
26/9 1996 1 Grejsdalen
9/10 1996 1 Vejle
12/10 1996 1 Stigsholm Sø
20/10 1996 2 Vejle Søndermark
24/10 1996 1 Nørrestrand
1/2 1997 1 Bjørnsknude
20/9 1997 1 Viuf
27/9 1997 1 Dollerup
30/9 1997 1 Nebbegård, Rands Fjord
2/10 1997 1 V Rosenvold
3-5/10 1997 1 Tiufkær
12/10 1997 1 V Rosenvold (N. c. caryocatactes)
16/10 1997 1 Tiufkær
22/10 1997 1 Barrit
Med. nov. – med. dec. 1997 1 Stouby (N. c. caryocatactes)
23/11 1997 1 Tiufkær
7/12 1997 1 Tiufkær
10-31/12 1997 1 Tiufkær
31/12 1997 1 Matstrup Skov
1/1 – 9/2 1998 1 Tiufkær
20/4 1998 1 Sellerup Skov

10/7 1998 1 Uldum
18/9 1998 1 Træskohage
19/9 1998 1 Rosenvold
11/9 1999 1 Torup Sø
7/10 1999 1 Horsens Golfbane
23/11 1999 1 Dallerup Skov
29/12 1999 1 Tiufkær
1/1 2000 1 Smidstrup
14/1 – 23/5 2000 1 Tiufkær
22/8 2000 2 Harrild Vandmølle
21/10 2000 1 Vejle Søndermark

Pirol Oriolus oriolus

Meget sjælden, sandsynligvis ikke årlig, yngletrækfugl samt sjælden- meget sjælden trækgæst fra Sydsverige og Mellemeuropa.

Collin (1895): ”I Hansted Skov ved Horsens sees den af og til om Foraaret.”

Videnskabelige Medd. fra den naturhist. Forening (1903): ”I Vonsild Præstegaards Have, S. f. Kolding, iagttoges en Pirol nogle Dage i Begyndelsen af Juni (1902).”

1973-74: ynglepar el. mulige ynglepar på 4 lokaliteter i Bjerre Herred

1972-74: 1 han Spjarup

Juli 1975 8 hanner Stenderupskovene (heraf 7 i Sønderskov)

1975: 1 par Barrit

1975: 1 par Askær

1976: 1 par Fiskebæk Kær

5-6 hanner Stenderupskovene

1 han Gelballe Skov

28/5 1980 1 Lottrup Skov

1980: 1 par Boller Nederskov

9/5 1981 1 Palsgård Slotspark

21/5 1981 3 Stenderup Sønderskov

18/6 1982 1 Dollerup Sø

27/7 1982 2 Stenderup Sønderskov

Juni 1983 1 han Kirstinebjerg Skov, Fredericia

23/5 1984 1 han Vorsø

23/7 1984 1 han Stenderup Hage

2/8 1984 1 han Nørrestrand

13/5 1985 1 han Nørrestrand

17/5 - 14/6 1985 1 Askær

26/5 1985 1 han Elbæk Skov

27/5 1985 1 han Jensgård Skov

16/6 1985 1 han Munkebjerg Skov

3/6 1986 1 Vorsø

30/11 1986 1 hun Rørbæk Sø

30/6 1987 1 han Krikholm/As Vig

4/6 1988 1 han Søvind

19/6 1988 1 han Husodde
27/6 1988 1 hun Husodde
Ca. 20/7 1988 1 Elbæk Skov
8/9 1988 1 hun/1k Kobbelskoven, Kolding
21-23/5 1989 1 han Klejs Skov
22/5 1989 1 han Vorsø
24/5 1989 1 han Stenderup Midtskov
25/5 1989 1 han Staksrode Skov
28/5 1989 1 Additsøerne
21/6 1989 1 Stenderup Sønderskov
11/5 1990 1 Trelde Næs
11/5 1990 1 Rands
19/5 1990 1 han Askær
Juni 1991 1 han Stensballe Skov
23/5 1992 1 han Stensballe Skov
23/8 1992 1 hun/1k Rosenvold - rastende
26/8 1992 1 hun/1k Rosenvold - trak SV
20/5 - 13/6 1993 1 han Stensballe Skov
30/5 1993 1 han Fårup Sø
31/5 1994 1 han Spjarup
30/5 1995 1 han Vorsø
28/5 1996 1 Løver Odde
2/6 1996 1 Løver Odde
8/6 1996 1 Trelde Næs
28/6 1996 1 han + 1 hun Rørbæk Sø
31/5 1997 1 syng. Løver Odde
7-8/6 1997 1 syng. Vesterskoven, Vorsø
17/5 1998 1 Nørrestrand
24/5 1998 1 han Dollerup
27/5 1998 1 Vorsø
6/6 1998 1 syng. Fårup Sø
11/6 1998 4 (1 gul + 3 grønne) Hastrup Sø
21/5 1999 1 syng.. Vorsø
24/5 1999 2 Trelde Næs

Fyrremejse *Parus montatus* (SU-art t.o.m. 1990/xxxx)

1996: 2 iagttagelser (ikke forelagt SU)

2000: 1 par med 2 juv. Stallerup Sø (Godkendt af SU)

2001: 17 obs. af 29 eks. fra følgende lokaliteter: Svanemosen, Stallerup Sø, Dons Søndermose, Høll og Uldum Kær.

2002: Ynglefund – Stallerup Sø. 21 eks. på 4 lokaliteter, incl. gengangere.

2003: 9 eks. på 7 lokaliteter (26/6 1 syngende Gudenåen, Tørring – Vestbirk).

Pungmejse *Remiz pendulinus* (SU-art t.o.m. 1982/83)

Indvandret til Danmark i 1960'erne, antageligt fra Østeuropa.. Første fund er fra 1963 på Bornholm. Det første ynglefund i landet er fra 1965.

Op igennem 1980'erne stabiliserede bestanden sig, men fra midten af 1990'erne ses markant tilbagegang i bestanden, som dårligt nok havde nået at etablere sig, men det er, hvad der kan ske med nyindvandrede arter, som oven i købet er trækfugle.

23/8 1983 3 1k Tørring Kær (Godkendt af SU)

1983 1 han byggede rede Nørrestrand

1984: 15 eks. på 5 lokaliteter

1985: 1/11 1 Vorsø

1986: Ca. 7 eks., hvoraf flere 1k Uldum Kær – han-rede fundet

1987: 7 eks. på 3 lokaliteter - redebyggende fugle iagttaget på 2 lokaliteter

1988: 2 par med 3 og 3 1k + 2 redebyggende hanner + min. 4 usp. - iagttaget på 4 lokaliteter

1989: 9 par + 5-6 forsøg på 6 lokaliteter. Endvidere 8-9 eks. udenfor ynglelokaliteterne.

1990: 5-7 par + 1 forsøg på 4 lokaliteter. 7-8 eks. udenfor ynglelokaliteterne.

1991: Min. 11 par på 5-6 lokaliteter. 4 eks. udenfor ynglelokaliteterne.

1992: Min. 8 par på 5 lok. Endvidere 3 forsøg på yderligere 3 lok. Udenfor ynglelokaliteterne iagttoges 12 eks. I alt 41 obs. af 116 eks. (heraf adskillige gengangere).

1993: 4-5 par på 2 lok. Yderligere 2 forsøg på 2 lok. I alt 34 obs. af 74 eks.

1994: 3 par + 1 forsøg på 2 lokaliteter. 29 obs. af 53 eks. Trækobs.: 3/4 1 N Holtser Hage, 7/9 - 8/10 13 eks. Rosenvold, 23/9 4 SV Nørrestrand.

1995: 6 par + 1 forsøg på 6 lokaliteter. Trækobs.: 13/4 1 N Holtser Hage, 27/5 1 N Holtser Hage, 24/9 2 SV Rosenvold.

1996: 1-2 par (rede med rør, Egebjerg Kær + rede uden rør, Uldum Kær). 17 obs. af mindst 27 eks. Trækobs.: 13/4 1 R->N Holtser Hage, 1/10 5 R->S Bollerstien.

1997: 4-5 par (Egebjerg kær 1 par, Uldum Kær 3-4 par). Ca. 20 eks. En ”kæmpeobs.”: 24/9 11 rastende Rosenvold.

1998: 1-2 par i Uldum Kær. Min. 12 eks. Trækobs.: 2/5 2 N Holtser Hage.

1999: 3-4 par (Egebjerg Kær, Lund Kær og Uldum Kær). 10 obs. af 9 eks.

2000: 0-1 par (Dons Sønderlø). 2 obs. af 2 eks.

2001: 5-6 par (Høll - 4 aktive reder, Kolding Å – rede med rør, Rands Fjord ?). 13 obs. af 22 eks.

2002: 0-1 par (Uldum Kær). 10 obs. af 12 eks.

2003: 0-2 par (Høll og Rands Fjord). 11 obs. 11 eks.

Ringdrossel *Turdus torquatus*

Collin (1895): ”I Eistrup-Egenen er denne den almindeligste Drossel i Træktiden.”

Faber (1898) skriver: “Er oftere fanget i Doner ved Rugballegaard pr. Vejle. Den 4/10 90 saa jeg et Expl. Skudt ved Brande.”

Georgsen (1901): “5-6 Eksemplarer af Ringdroslen blev i Julen 1900 sete ved Bygholm (K. Wiinsted).”

Georgsen (1902): “Nogle faa Ekspl. af Ringdroslen blev for ca. 4 Aar siden sete i Præstegaards-haven i Thyrsted.”

Den “første” i amtet i “nyere” tid er: 29/4 1967 1 han Klattrup, Fredericia .

Store obs.: 24/4 1982 11 Ulvehaven, Vejle, 17/4 1987 8 Runkenbjerg, 29/4 1989 26 Dollerup Sø, 11/10 1996 9 Vorsø, 25/4 1997 10 Flasken, Endelave, 1/5 1999 6 N Skamlingsbanken.

År	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983
Antal	2	1	6	2	10	13	1	8	49	19
År	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993
Antal	15	26	2	30	40	46	14	4	22	16
År	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Antal	16	23	30	37	21	26	22	20	10	4

Forekomst af Ringdrossel i Vejle Amt, 1974 – 2003.

Rødtoppet Fuglekonge *Regulus ignicapillus* (SU-art t.o.m. 1967/68)

Sjælden træk- og sommergæst fra Mellemeuropa. Meget sjælden- sjælden yngltrækfugl.

Samtlige data:

30/3 1974 1 Drenderup Skov
5/4 1982 1 hun Trelde Næs
3/6 1982 3 syng. Additnæs
15/4 1994 1 Klostermølle
23/5 1994 1 Hannerup Skov
30/5 – 5/6 1998 1 syng. Munkebjerg Skov
9/10 1998 1 Rosenvold
29/12 1998 1 Rohden Å
10/4 1999 1 Løver Odde
28/3 2000 1 ad. han Galtkær
2/4 2000 1 Ejstrup Sø
26/11 2000 1 Nørrestrand
28/4 2001 1 syng. Gauerlund Skov
12/5 2001 1 syng. Knabberup Skov
20 – 21/3 2002 1 hun Uldum
21 - 24/4 2002 1 syngende Vejle Søndermark
25/6 2002 1 hun Løver Odde
21 – 24/7 2002 1 han + 1 hun + 5 juv. Stenderup Nørreskov
10/8 2002 4 Løver Odde
25/9 2002 1 hun Solkær Enge
29/9 2002 1 Rosenvold
4/11 2002 1 han Donsøerne
16/5 2003 1 syng. Grund Skov
25/12 2003 1 han Trelde Næs

Rødstrubet Piber *Anthus cervinus*

Sjælden trækgæst om efteråret (med./ult. august – pr. oktober). Meget sjælden trækgæst om foråret (maj).

Samtlige data:

9/5 1985 1 Ejstrupholm
20/8 1990 1 SV Stenderup
12/9 1990 1 indtræk. Bjørnsknude
13/9 1991 1 indtræk. Bjørnsknude
21/9 1991 2 SV Rosenvold
6/10 1991 1 S Bollerstien
23/8 1992 1 SØ Rosenvold
25/8 1992 1 V Rosenvold
29/8 1992 1 Borre Odde
18/9 1992 3 S Rosenvold
26/9 1992 1 S Rosenvold
2/10 1992 1 SSØ Brakør Nakke
18/9 1993 1 Borre Odde
19/9 1993 1 Brigsted
19/9 1993 1 SV Rosenvold
22/9 1993 4 SV Rosenvold
31/8 1994 1 SV Rosenvold
17/9 1994 1 SV Rosenvold
18/9 1994 1 indtræk. Bjørnsknude
19/9 1994 1 SV Rosenvold
25/5 1995 1 N Holtser Hage
28/8 1995 1 SV Rosenvold
27/9 1995 1 SV Rosenvold
11/5 1996 1 Nørrestrand
1/9 1996 1 SV Børup Sande
11/9 1996 2 SV Rugballe ved Bygholm Sø
28/9 1996 1 V Træskohage
6/10 1996 1 SV Træskohage
18/5 1997 1 Borre Odde
31/5 1997 1 Øvre, Endelave
12/9 1998 1 S Brigsted
16/9 1999 1 S Stenderup
3/5 2000 1 overflyvende Egebjerg Enge
20/9 2002 1 SV Solkær Enge

Stor Tornskade *Lanius excubitor*

Sjælden ynglefugl. Fåtallig træk- og vintergæst fra Fennoskandinavien og Rusland. Tilsyneladende tilbagegang i antallet af træk- og vintergæster i løbet af de seneste 10-15 år.

Herschend (1884): ”... i November 1883 saa jeg atter en siddende i et af Træerne ved Landevejen ved Hovedgaard Jernbanestation.”

Collin (1888): ”... skudt ved Fruergaard (Eistrup Sogn) d. 19. Okt. 1882, ... i Nov. 1883 ved Hovedgaard Station, ... skudt ved Vellinggard pr. Vejle d. 2. Nov. 1882.”

Collin (1895): ”I Uldum-Egnen (Veile) synes den i de senere Aar at blive almindeligere. Hr. K. Kristensen (Hesselballe) traf den for en halv Snes Aar siden – ifølge Brev til Prof. Lütken – i et Krat

der paa Egnen midt i Rugetiden. ... 18. Febr. 1891 Store Grundet Mark ved Veile ... I Efteraaret 1891 og i Begyndelsen af Vinteren 1891/92 forekom den hyppigt i Egnen ved Eistrup, hvor N. Larsen skjød den d. 22. Jan. 1892 ... 6. Febr. Skudt ved Engelseholm pr. Veile ... Konservator Sørensen i Horsens havde samme Vinter nogle og tyve Stkr. Til Udstopning ... Under en Snestorm d. 20. Jan. 1891 saae Hr. Larsen to Individider af denne Art i sin Gaard, hvorfra de dog hurtigt forsvandt, den ene forfølgende en Spurv."

Faber (1898): "Den 18/2 1891 saa jeg 1 Expl. paa St. Grundet Mark ved Vejle. Ved Engelsholm pr. Vejle blev den skudt den 6/2 92 og 29/9 95. Sidstnævnte Expl. findes i min Samling."

Kristensen (1899): "er Langt fra sjælden her paa Egnen. I 1884 saa jeg den i Yngletiden i Rævebuskene ved Vester Ørum; men om den ynglede vides ikke. Den blev skudt ved Uldum den 30. Novbr. S. A. og i Grejs i Efteraaret 1891, og jeg saa den i et hegn på Hvolgaards Mark i Nærheden af Langskov Skole den 20. Marts 1896."

Schougaard (1920-24): "enkelte Efteraar og Vinter, sk. 25.: X : 1903 og 10.: X : 1912."

Wielandt (1924): "♀ sk. i Urup 3 : XII : 1891 og ♂ sk. i Rask 26 : XII : 1889 (Zool. Mus.)."

21/4 1933 1 plantage ved Randbøl Hede (Meinhardt, DOFT, 27. årg., 1933)

24/5 1933 rede med 6 pull. plantage ved Randbøl Hede (Meinhardt, DOFT, 27. årg., 1933)

30/4 1934 1 + rede med 6 æg plantage ved Randbøl Hede (Meinhardt, DOFT, 28. årg., 1934)

24/5 1934 4 store unger plantage ved Randbøl Hede (Meinhardt, DOFT, 28. årg., 1934)

13/5 1956 iagtt. Randbøl Hede

31/3 1962 1 Skyttehuset, Vejle

5/4 1963 1 Skyttehuset, Vejle

14/1 1966 1 Vejle Havn

3/12 1966 1 Svineryggen, Vejle

9/3 1969 1 Grejsdalen

År	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990
Antal	13	10	5	16	35+	35	30+	25	35+	24	20	45+	45+
År	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Antal	38+	46	30+	16	10+	10+	29+	23	13+	30+	30+	86	54

Forekomst af Stor Tornskade i Vejle Amt, 1978 – 2003.

Største observation: 12/3 2000 7 Nørlund Plantage.

Ynglefund: Stor Tornskade har nogle (de fleste) år i hvert fald siden 1980'erne ynglet fast på 1-3 lokaliteter i amtet.

Gulirisk Serinus serinus

Sjælden træk- og sommergæst fra Mellemeuropa. Meget sjælden yngletrækfugl.

Samtlige data:

Maj-juni 1978 1 syng. Fredericia
18/5 1980 1 Bygholm Sø
24/4 1983 1 syng. Uhrhøj, Vejle
22/5 1985 1 han Fredericia
21-24/4 1990 1 syng. Bramdrupdam
23/9 1990 1 han Halle Sø
15/5 1993 1 syng. Rørbæk Sø
20/8 1994 1 Hjarnø
27/5 1995 2 N Holtser Hage
31/8 1995 1 SV Rosenvold
2/9 1995 1 Borre Odde
25/4 1996 1 syng. Bredballe
14/5 1996 1 N Holtser Hage
14-18/5 1996 1 Fredericia Vold
3-4/6 1996 1 Fredericia Vold
6-8/6 1996 1 syng. Kolding Gl. Kirkegård
16/6 1996 1 Fredericia
18/8 1996 1 trækforsøg Rosenvold
27/4 1997 1 syng. Endelave By
3/5 – 19/5 1997 2 hanner + 1 hun Bygholm Park
4/5 1997 1 syng. Geneesgade, Horsens
9-12/5 1997 1 syng. Børkop
13/5 1997 1 syng. Rosenvænget, Horsens
24/5 – 2/6 1997 1 syng. Byparken, Kolding
25/5 – 9/6 1997 1 syng. Palsgård Slotspark
29/6 1997 1 syng. Mølholmsdalen, Vejle
19-20/4 1998 1 R -> N Holtser Hage
21/4 – 3/5 1998 2 Palsgård Slotspark
4/5 1998 1 trækforsøg Holtser Hage
9/5 1998 1 R Øvre, Endelave
24/5 – 6/6 1998 2 Vejle (ved Banegården)
21/7 1998 1 Vejle (ved Banegården)
29/5 1998 1 syng. Haraldskær
4/6 1998 1 Jelling
14 + 21/4 1999 1 syng. Kolding Gl. Kirkegård
2/5 1999 1 syng. Kolding Gl. Kirkegård
18-19/5 1999 1 syng. Vejle
18/6 1999 1 syng. Kolding Gl. Kirkegård
16/4 2000 1 N Vejle Søndermark
17/4 2000 1 Vejle Nørreremark
18/4 2000 1 hun Kolding Gl. Kirkegård
19/4 2000 1 syng. Nørrestrand
19/4 2000 1 syng. Koldinghus
26/4 2000 2 Kolding Gl. Kirkegård
29/3 2003 1 Rørbæk Sø - overflyvende mens den sang!
27/4 2003 1 Rands Fjord

5/5 2003 1 Snoghøj

År	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991
Antal	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2	0
År	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Antal	0	1	1	4	7	10	9-10	2-3	6-7	0	0	3

Forekomst af Gulirisk i Vejle Amt, 1980 – 2003.

Stor Korsnæb *Loxia pytyopsittacus* (SU-art t.o.m. 1967)

Sjælden – ret almindelig træk- og vintergæst fra nordlige Fennoskandinavien og Rusland. Meget sjælden ynglefugl. Optræder som regel i invasioner.

Collin (1877): ”Sergeant Bruun angiver at have skudt den ved Trelde pr. Fredericia i November 1861.”

Samtlige data:

5/5 1977 5 Skolbjerg

28/2 1976 2 hanner + 1 hun Frederikshåb Plantage

31/10 1982 2 Randbøl Hede

17/2 1983 7 Randbøl Hede

23/6 1994 1 Harrild Hede

12/1 1985 2 Hastrup Mølle

7/5 1985 1 han Frederikshåb Plantage

24/10 1985 3 Nørrestrand

29/11 1986 1 han Nørrestrand

15/11 1987 5 Salten Langsø

19/11 1988 1 hun/1k Nørrestrand

16/10 1990 – 31/3 1991 Meget stor invasion med i alt 357 eks. i amtet.

Største obs. var 7/12 1990 24 Nørrestrand, 16/12 1990 23 Brude Sø, 1/1

1991 34 Brude Sø og 11/1 1991 30 Brude Sø.

18/8 1993 2 Rosenvold

30/10 1993 3 Brude Sø

9/11 1993 2 Nørrestrand

14/11 1993 2 Boller Nederskov

12/12 1993 2 Hampen Sø

19/12 1993 2 Klejs Skov

1/12 1994 1 Nørrestrand

14/1 1995 2 hanner Brude Sø

13/2 1995 1 Brude Sø

20/10 1996 1 SV Rosenvold

8/12 1996 1 Nøttrup

9/11 1997 8 Torup Sø

20/3 1999 2 Hastrup Sø

4/10 1999 1 SV Rosenvold

7/10 1999 2 SV Rosenvold

13/10 1999 1 SV Rosenvold
9/1 2000 2 Haraldskær
15/12 2001 2 Brude Sø
18/4 2002 3 Højlund Skov
30/9 2002 1 hun NV Galtkær
23/11 2002 2 Klostermølle
15/3 2003 2 Rørbæk Sø

Hvidvinget Korsnæb *Loxia leucoptera* (SU-art t.o.m. 1973)

Meget sjælden – sjælden træk- og vintergæst fra nordlige Fennoskandinavien og Nordrusland. Optræder som regel i invasioner.

Kristensen (1899): ”Den 14. September 1898 modtog N. Larsen, Ejstrup, et Exemplar af denne sjældne Fugl fra Palsgaards Plantage. Samme Efteraar blev den skudt ved Ejstrup (Sofus Larsen).”

Larsen (1901): ”Af denne endnu sjældne Art har jeg erholdt 2 Eksemplarer fra Palsgaard Skov, og 1 er skudt i min Have af min Søn Sofus Larsen.”

Wielandt (1924): ”T, er set i Palsgaard Skov.” (T = iagttaget enkelte eller faa Gange)

17/2 1983 1 han Nørrestrand
27/12 1986 4 Donssøerne
5/10 1988 1 hun/1k Nørrestrand
15/10 1988 1 hun/1k Horsens
29/10 1988 2 Nørrestrand
30/10 1988 1 han Torup Sø
30/10 1988 1 han Egebjerg Kær
26/11 1988 1 han Nørrestrand
31/12 1988 1 hun/1k Salten Langsø
23/9 1990 1 han Torup Sø
14/10 1990 1 han Halle Sø
16/10 1990 1 hun/1k Brude Sø
11/11 1990 1 han Borre Odde
17/11 1990 1 hun/1k Bjørnsknude
24/12 1990 1 hun/1k Borre Odde
13/1 1991 1 hun/1k Hampen Sø
5/10 1991 10 Blidsø
24/7 1993 1 Vejle Søndermark
31/7 1993 1 Torup Sø
24/9 1994 1 han Hampen Sø
18/8 1996 1 V Rosenvold
Pr. marts 1997 2 Salten Langsø
31/8 1997 4 Hampen Sø
4/9 1997 1 Rosenvold
4/10 1997 1 SV Rosenvold
18/10 1997 1 Hampen Sø
17/12 1997 1 Galtkær

22/8 1999 2 SV Rosenvold
 8/8 2002 2 SØ Staksrode
 13/8 2002 1 han SV Solkær Enge
 15/8 2002 1 han SV Solkær Enge
 1/9 2002 1 ad. han Hampen Sø
 12/10 2002 4 (han + 3 ”grønne”) Tinet Krat
 13/12 2002 1 Salten Langsø

Laplandsværling *Calcarius lapponicus*

Fåttallig træk- og vintergæst fra Nordskandinavien, eventuelt nordlige Finland og Rusland. Iagttaget regelmæssigt, men ikke årligt. Der foreligger ingen oplysninger om forekomst før 1982.

De største forekomster: 5/3 1989 6 Borre Odde og 17/11 1990 5 Bjørnsknude.

År	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
Antal	1	0	2	1	7	2	0	7	1	0	11
År	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Antal	4	15	6	6	5	1	0	0	1	2	2

Forekomst af Laplandsværling i Vejle Amt, 1982 – 2003.

Snespurv *Plectrophenax nivalis*

Træk- og vintergæst fra Grønland og Fennoskandinavien. Forekommer årligt i amtet, men i meget svingende antal.

Faber (1898) skriver: "Paa Stranden ved Vejle Havn har jeg flere Gange truffet mindre Flokke om Vinteren."

25/2 1911 3 Kolding (Hagerup, DOFT, 6. årg., 1911-12, p. 199)
 5/3 1911 3 ♀♀ Kolding (Hagerup, DOFT, 6. årg., 1911-12, p. 199)

De største forekomster i perioden 1974 – 2003: 16/3 1975 22 Endelave, Med. jan. 1976 30 Trelde Næs, 21/11 1977 80 Endelave, 31/3 1978 30-40 Kalbøl, 19/12 1979 25 Juelsminde, 21/12 1979 20 Hygum, 6/1 1980 20 Fårup Sø, 16/3 1980 30-35 Ashåb, 6/2 1983 33 Borre Odde, 25/3 1984 50 Ulkind, 26/11 1984 34 Endelave, 1/2 1985 21 Juelsminde, 6/3 1987 28 Vorsø, 2/2 1991 26 Borre Odde, 23/11 1996 17 Horsens Havn, 18/11 2000 30 Stenderup Hage og 16/1 2003 18 Rosenvold.

År	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983
Antal	-	22	45	85	30-40	58	55-60	6-7	22-23	56-58
År	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993
Antal	106	62	35	57	17	27	26	32	21	6
År	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Antal	23	19	62	12	11	9	54	8	15	19

Forekomst af Snespurv i Vejle Amt, 1974 – 2003.

Litteratur:

- Adelholt, E., 1958: Genfangster i Danmark 1900 – 1955 af fugle ringmærkede i udlandet. DOFT, 52. årg., 1958.
- Bang, J., 1972: Nogle oplysninger om Sløruglens forekomst i Danmark 1960 - 1972 (*Tyto alba guttata* (Brehm)).
- Bang, J. og S. Rosendahl, 1972: Nogle oplysninger om Kirkeuglens forekomst i Danmark 1960 - 1972 (*Athene Noctua noctua* (Scopoli)).
- Bomholt, P. m. fl., 1975: Fuglelokaliteter i Vejle Amt.
- Christensen, H., 1940: Fuglelivet ved Fårup Sø. DOFT, 34. årg., 1940.
- Collin, J., 1877: Ornithologiske bidrag til Danmarks Fauna.
- Collin, J., 1888: Bidrag til Kundskaben om Danmarks Fuglefauna.
- Collin, J., 1895: Faunistiske og Biologiske Meddelelser om Danske Fugle.
- Dybbro, T., 1970: Bestanden af Stork (*Ciconia ciconia*) i Danmark 1961-1969.
- Dybbro, T., 1978: Oversigt over Danmarks fugle 1978.
- Faber, A.H., 1898: Optegnelser om Vejle- og Horsensegnens fuglefauna i årene 1875 - 1897.
- Georgsen, F., 1901: Nogle ornithologiske notitser fra Horsenseggen.
- Georgsen, F., 1902: Iagttagelser gennem sommeren 1901 og 1902.
- Hagerup, A., 1907: Fugletræk ved Kolding i oktober 1906. DOFT, 2. årg., 1907-08.
- Hagerup, A., 1911: Meddelelser fra de danske ornithologiske stationer for 1910. DOFT, 5. årg., 1910-1911.
- Hagerup, A., 1912: Meddelelser fra de danske ornithologiske stationer for 1911. DOFT, 6. årg., 1911-1912.
- Have Jørgensen, O., 1970: Fuglelivet ved jagtreservatet Vejle inderfjord i årene 1961-68. Flora og Fauna, 76. årg., 1970.
- Herschend, P., 1884: Iagttagelser over Danmarks fuglefauna med særligt hensyn til egnen mellem Horsens og Århus.
- Herschend, P., 1895: Ornithologiske iagttagelser.
- Hørring, R., 1919: Danmarks Fauna 23 - Fugle I.
- Hørring, R., 1926: Danmarks Fauna 30 - Fugle II.
- Hørring, R., 1934: Danmarks Fauna 39 - Fugle III.
- Jespersen, P., 1937: De forskellige uglers udbredelse og forekomst i Danmark. I. Ynglende arter.
- Jespersen, P., 1938: De forskellige uglers udbredelse og forekomst i Danmark. II. Ikke ynglende arter.
- Jespersen, P., 1947: Hedehegen (*Circus pygargus* (L.)) som ynglefugl i Danmark.
- Johansen, H. og A. Bjerring: Bestanden af Stork (*Ciconia ciconia*) i Danmark 1952-1954.
- Johansen, H. og A. Bjerring: Bestanden af Stork (*Ciconia ciconia*) i Danmark 1955-1960.
- Kjærbølling, N., 1852: Danmarks Fugle.
- Kristensen, K., 1899: Nogle ornithologiske Optegnelser fra Uldum-Eggen og nærmest tilstødende Egne. Flora og Fauna, 5. årg., 1899.
- Larsen, N., 1901: Bidrag til den jydsk Fuglefauna. Flora og Fauna, 7. årg., 1901.
- Malling Olsen, K., 1992: Danmarks fugle - en oversigt.
- Møller, A. P., 1981: Dansk Ornithologisk Bibliografi.
- Novrup, L., 1972: Den Sorte Stork (*Ciconia nigra*) har bygget rede i Midtjylland. (Danske Fugle, 24. årg., 1972)

- Poulsen, C. M., 1949: Optegnelser over sjældnere Fugle. Flora og Fauna, 55. årg., 1949.
- Rosendahl, S., 1963: Invasionen af Mallemukker (*Fulmarus glacialis* (L.)) i foråret 1962.
- Rosendahl, S., 1968: Nøddekriger 1968 (*Nucifraga caryocatactes* (Linnaeus)).
- Rosendahl, S., 1969: Invasion af Nøddekriger (*Nucifraga caryocatactes* (L.)) 1968.
- Rosendahl, S., 1970: Nøddekriger (*Nucifraga caryocatactes* (L.)) i Danmark 1969.
- Rosendahl, S., 1974: Danmarks storke.
- Rosendahl, S., 1975: Den sorte stork.
- Rosendahl, S. og P. Skovgaard, 1972: Nogle meldinger af Kirkeugle (*Athene noctua noctua* (Scopoli)).
- Rosendahl, S. og P. Skovgaard, 1972: Genmeldinger af danske slørugler (*Tyto alba guttata* (Brehm)).
- Salomonsen, F., 1963: Oversigt over Danmarks fugle.
- Schjøtz-Pedersen, S., 1943: Dons-Søernes fuglefauna. DOFT, 37. årg., 1943.
- Schougaard, S. N., 1920-24: Fuglene i Bryrupegnen.
- Skotte Møller, H., 1970: Midtjyllands fugle.
- Skovgaard, P., 1920: Nogle Data om Danske Fugle i CHR. REIMERS Samling i Viborg.
- Skovgaard, P., 1927: Et Blad af Havørnens (*Haliaëtus albicilla*) Saga i Danmark.
- Wielandt, E., 1924: Fuglelivet i Palsgaard Skov og Omegn paa Grundlag af Iagttagelser fra 1916 – 1923 (Danske Fugle, Bind 1., 1920 – 24)
- Winge, H., 1903: Om jordfundne Fugle fra Danmark. Videnskabelige Meddelelser fra den naturhistoriske Forening i Kjøbenhavn for Aaret 1903.

Feltornithologen (FO) 1959 - 1970.

Dansk Ornithologisk Forenings Tidsskrift (DOFT) 1. årg. 1906 - 97. årg. 2003.

Lokalrapporter fra DOF i Vejle Amt. (Bladet/Svingfjeren/Fugle i Vejle Amt/m.m.)

Ornitologisk Tidsskrift (Udgivet af Kolding Ornitologiske Forening) 1969 - 1971.

Danske Fugle, Bind 1-3, 1920 – 1931.

Danske Fugle, Bind 4-5, 1932 – 1942.

Danske Fugle 20. årg. 1968 – 32. årg. 1980.

Gejrfuglen (Danmarks feltbiologiske Ungdomsforening – Aarhus/Østjysk Biologisk Forening), 1. årg. 1965 – 39. årg. 2003.

Flora og Fauna (udvalgte artikler). 52. årg., 1946 – 55. årg., 1949 og 61. årg., 1955 – 94 årg., 1988.